

Achyranthes L.

Luisa Ramos Senna Souza

Instituto Federal da Bahia; luisasenna@gmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Achyranthes*, *Achyranthes aspera*.

COMO CITAR

L.R. Senna 2020. *Achyranthes* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB25089>.

DESCRIÇÃO

Ervas ou subarbustos, perenes com caules não suculentos. **Plantas** monoicas com folhas opostas, membranáceas, opostas, margem inteira. **Florescências parciais** pedunculadas, laxas, dicásios sem flores modificadas, flores bissexuais, bráctea e bractéolas presentes, bractéolas sem crista dorsal. **Flores** escariosas, perianto com 4-5 tépalas, fundidas na base; androceu com cinco estames fundidos na base formando tubo estaminal, alternados com pseudoestaminódios, filetes unilobados, tubo estaminal livre do perianto, anteras bítecas; estigma capitado, estilete longo, ovário uniovulado. **Semente** vertical.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas)

Nordeste (Bahia)

Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

Achyranthes aspera L.

Tem como sinônimo

heterotípico *Achyranthes indica* (L.) Mill.

DESCRIÇÃO

Caule: crescimento do caule(s) ereto(s); **presença de estolão** ausente(s). **Folha:** peciolada(s) sim; **textura das folha(s)** membranácea(s). **Inflorescência:** presença de pedúnculo(s) presente(s). **Flor:** ápice(s) das bractéola(s) espinescente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbustos eretos ou decumbentes, 0,4-1,0 m alt.; caule não estolonífero, ramos jovens pubescentes, glabrescentes, tricomas simples. **Folhas** membranáceas, levemente discolors, verdes, face abaxial mais clara, pecioladas, obovadas, 2,5-6,0 × 2,0-4,0 cm, base cuneada ou atenuada, margem inteira ou crenulada, ápice obtuso, mucronulado, eucamptódromas, pubescentes nas duas faces, tricomas simples. **Inflorescência** 7,0-20,0 cm compr. **Flores** esverdeadas ou purpúreas, escariosas; bráctea e bractéolas subiguais; bráctea globosa, côncava, 3,0-3,5 mm compr., base truncada, margem inteira, ápice aristado, inteiro, glabra; bractéolas ovais, côncavas, 3,0-3,5 mm compr., base truncada, margem inteira, ápice aristado, glabras; tépalas 3-nérvias, oblongas, 4,0-4,5 mm compr., base truncada, margem inteira, ápice agudo, inteiro, glabras; tubo estaminal e filetes 1,6-2,0 mm compr., pseudo-estaminódios menores que a altura dos estames, fimbriados, anteras oblongas, 0,2-0,3 mm compr.; ovário obovóide, estilete longo, aproximadamente mesmo tamanho ou maior que o ovário.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas)

Nordeste (Bahia)

Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Krieger, s.n., PACA, 85326, Minas Gerais