

Aira L.

Leonardo Nogueira da Silva

Universidade Federal do Rio Grande do Sul; nogueira.silva@ufrgs.br

Liliana Essi

Universidade Federal de Santa Maria; liliana.essi@ufsm.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Aira*, *Aira elegantissima*.

COMO CITAR

da Silva, L.N., Essi, L. 2020. *Aira* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB106131>.

DESCRIÇÃO

Ervas anuais, cespitosas, eretas ou geniculadas. Colmos delgados, 10-50 cm de altura. Lâminas foliares filiformes ou plantas, glabras, ápice obtuso. Inflorescências em panículas abertas, laxas, obovadas. Espiguetas solitárias, pediceladas, bifloras, de 1.5-2.5 mm de comprimento. Glumas persistentes, iguais ou subiguais, uninervadas, escabrosas no dorso ao longo da nervura principal, míticas, agudas, maiores que os lemas. Lema inferior mítico ou aristado, 5-nervado, escabroso, glabro, bifido. Lema superior aristado, arista dorsal geniculada, 1.5-2 mm de comprimento, 5-nervado, escabroso, glabro, ápice bifido. Pálea membranosa, hialina. Estames 3.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Pampa

Tipos de Vegetação

Campo Limpo

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

Aira elegantissima Schur

Tem como sinônimo

heterotípico *Aira elegans* Willd. ex Gaudin

DESCRIÇÃO

Ervas anuais, cespitosas, eretas ou geniculadas. Colmos delgados, 10-50 cm de altura. Lâminas foliares filiformes ou plantas, glabras, ápice obtuso. Inflorescências em panículas abertas, laxas, obovadas. Espiguetas solitárias, pediceladas, bifloras, de 1.5-2.5 mm de comprimento. Glumas persistentes, iguais ou subiguais, uninervadas, escabrosas no dorso ao longo da nervura principal, míticas, agudas, maiores que os lemas. Lema inferior mítico ou aristado, 5-nervado, glabro, ápice agudo. Lema superior aristado, arista dorsal geniculada, 1.5-2 mm de comprimento, 5-nervado, glabro, ápice bifido. Pálea membranosa, hialina. Estames 3.

Forma de Vida

Ervã

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Naturalizada, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Pampa

Tipos de Vegetação

Campo Limpo

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

I.I. Boldrini, 1143, ICN, 116651, Rio Grande do Sul

BIBLIOGRAFIA

Zuloaga, F.O., Morrone, O. & Belgrano, M.J. (eds.) 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3v.

Cited for DF as *Aira caryophyllea* by:

Filgueiras, T.S. 1991. A floristic analysis of the Gramineae of Brazil'Distrito Federal and a list of the species occurring in the area. Edinb. J. Bot. 48(1): 73-80. (voucher not found).