

# Augusta Pohl

Juliana Amaral de Oliveira

Universidade de São Paulo; jujumaral@gmail.com

---

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Augusta*, *Augusta longifolia*.

## COMO CITAR

Oliveira, J.A. 2020. *Augusta* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB13832>.

## Tem como sinônimo

homotípico *Augustea* DC.

heterotípico *Bonifacia* Silva Manso ex Steud.

heterotípico *Lindenia* Benth.

heterotípico *Schreibersia* Pohl

heterotípico *Siphonia* Benth.

## DESCRIÇÃO

Arbustos a subarbustos; ramos cilíndricos; entrenós de tamanho variável. Estípulas interpeciolares triangulares, livres ou conadas. Folhas opostas decussadas. Flores 5-meras actinomorfas ou levemente zigomorfas, homostílicas, prefloração contorta; estames 5, subsésseis, exsertos, inseridos na fauce; ovário bilocular, plúrioovulado, estigma bífido, exserto. Cápsula septicida, deiscência explosiva através da contorção do mesocarpo.

## COMENTÁRIO

### Referências:

Delprete, P.G. 1997. Revision and typification of Brazilian *Augusta* (Rubiaceae, Rondeletieae), with ecological observations on the riverine vegetation of the cerrado and Atlantic forests. *Brittonia* 49(4): 487-497.

Campos et al. 2006. Flora de Grão-Mogol, Minas Gerais: Rubiaceae. *Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo* 24: 41-67.

Zappi et al. 2014. Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Rubiaceae. *Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo* 32(1): 71-140.

### Forma de Vida

Arbusto, Subarbusto

### Substrato

Rupícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

### Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

### Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria

### Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Tocantins)

Nordeste (Bahia, Maranhão)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

# Augusta longifolia (Spreng.) Rehder

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Augusta longifolia*, .

## Tem como sinônimo

basiônimo *Ucriana longifolia* Spreng.  
homotípico *Augusta longifolia* (Spreng.) Rehder var. *longifolia*  
homotípico *Schreibersia longifolia* (Spreng.) Kuntze  
homotípico *Tocoyena mansoana* (Spreng.) Angely  
heterotípico *Augusta attenuata* Pohl  
heterotípico *Augusta glaucescens* Pohl  
heterotípico *Augusta lanceolata* Pohl  
heterotípico *Augusta longifolia* var. *parvifolia* (Pohl) Delprete  
heterotípico *Augusta oblongifolia* Pohl  
heterotípico *Augusta parvifolia* Pohl  
heterotípico *Bonifacia riparia* Silva Manso ex Steud.

## DESCRIÇÃO

Subarbustos a arbustos ramificados, ramos eretos ou decumbentes, glabros a pubescentes. Estípulas decíduas, triangulares, ápice acuminado, glabras a pubescentes. Folha curtamente peciolada. Lâmina 1,5-20 x 0,6-4,1(-5,4) cm, estreitamente elípticas, lanceoladas a oblanceoladas, raro elíptica, ápice agudo a acuminado, base estreitamente cuneada, raro cuneada, margem plana ou revoluta, membranácea a coriácea. glabras na face adaxial, glabras a pubescentes na face abaxial. Inflorescência glabra a pubescente. Flores (pediceladas, pedicelos 2-15 mm compr.), botões florais com ápice agudo, hipanto turbinado, cálice glabro a pubescente, lobo do cálice estreitamente triangular a oblanceolado, 3-20 mm compr., persistente no fruto. Corola tubulosa vermelha, 3,5-7,5 cm compr., glabra a pubescente externamente, pubescente no tubo internamente, lobos com margem ciliolada; estilete pubescente próximo à base, estigma glabro. Cápsula 10-26 x 6-15 mm, glabra a pubescente. Sementes muitas por fruto, tetraédricas.

## COMENTÁRIO

Espécie reófito, ocorre entre pedras nas margens de rios.

## Forma de Vida

Arbusto, Subarbusto

## Substrato

Rupícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas


Norte (Tocantins)


Nordeste (Bahia, Maranhão)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

## MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., s.n., Flora Brasiliens, T06P6N0243-0244,  (T06P6N0243-0244)

s.c., s.n., Flora Brasiliens, T06P6N0241-0242,  (T06P6N0241-0242)

s.c., s.n., Flora Brasiliens, P06P6N0120,  (P06P6N0120)

R.M. Harley, 17529, K, CEPEC

J.B.E. Pohl, 904, K,  (K000470134)

### IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Augusta longifolia* (Spreng.) Rehder



Figura 2: *Augusta longifolia* (Spreng.) Rehder



Figura 3: *Augusta longifolia* (Spreng.) Rehder

### BIBLIOGRAFIA

Delprete, P.G. 1997. Revision and typification of Brazilian *Augusta* (Rubiaceae, Rondeletieae), with ecological observations on the riverine vegetation of the cerrado and Atlantic forests. *Brittonia* 49(4): 487-497.