

Bastardiopsis (K.Schum.) Hassl.

Aluisio José Fernandes Júnior

Universidade Federal do Maranhão; aluisio.fernandes@ufma.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Bastardiopsis*, *Bastardiopsis densiflora*, *Bastardiopsis grewiifolia*.

COMO CITAR

Fernandes-Júnior, A.J. 2020. *Bastardiopsis* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB9009>.

Tem como sinônimo

heterotípico *Abutilothamnus* Ulbr.

DESCRIÇÃO

Arbustos a árvores; folhas inteiras, às vezes lobadas. Inflorescências em panícula ou glomérulos. Flores subsésseis ou curtamente pediceladas; epicalice ausente; cálice basalmente arredondado; corola amarela; ovário 5-16-carpelar. Fruto esquizocarpo com 5 a 16 mericarpos. Sementes 1 por mericarpo.

COMENTÁRIO

Bastardiopsis é um gênero Neotropical composto por seis espécies, ocorrendo na América do Sul.

Forma de Vida

Arbusto, Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo)

Sul (Paraná)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Inflorescência em panícula; mericarpos 5, longamente aristados, tentaculares; sementes glabras.....*Bastardiopsis densiflora*
- 1'. Inflorescência em glomérulo; mericarpos 15-20, curtamente aristados, agudos; sementes vilosas.....*Bastardiopsis grewiifolia*

Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) Hassl.

Tem como sinônimo

basiônimo *Sida densiflora* Hook. & Arn.

DESCRIÇÃO

Folha: forma ovada(s)/cordada(s). **Inflorescência:** tipo panícula(s). **Flor:** compr. pedicelo(s) subséssil(eis) à 2 mm; **ovário(s)** 5 carpelar. **Fruto:** arista(s) longa(s) cerca 1 cm compr. tentacular(es); **número mericarpo(s)** 5. **Semente:** indumento glabra(s).

Forma de Vida

Arbusto, Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo)

Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.A.X. Borges, 203, RB

Bastardiopsis grewiifolia (Ulbr.) Fuertes & Fryxell

Tem como sinônimo

homotípico *Abutilon grewiifolium* (Ulbr.) Krapov.

DESCRIÇÃO

Folha: forma oblonga(s)/ovada(s). **Inflorescência:** tipo glomérulo(s). **Flor:** compr. pedicelo(s) pedunculada(s) 4 à 10 mm; **ovário(s)** 15 à 20 carpelar. **Fruto:** arista(s) curta(s) até 2 mm compr. aguda(s); **número mericarpo(s)** 15 à 20. **Semente:** indumento vilosa(s).

Forma de Vida

Arbusto, Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.H.G. Ule, 9589