

# Blutaparon Raf.

Luisa Ramos Senna Souza

Instituto Federal da Bahia; luisasenna@gmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Blutaparon*, *Blutaparon portulacoides*, *Blutaparon vermiculare*.

## COMO CITAR

L.R. Senna 2020. *Blutaparon* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15410>.

## Tem como sinônimo

homotípico *Philoxerus* R. Br.

heterotípico *Telanthera* R. Br.

## DESCRIÇÃO

**Ervas** perenes, caule não suculento. **Plantas** monoicas com folhas opostas, carnosas, margem inteira. **Florescências** parciais pedunculadas, condensadas, dicásio sem flores modificadas, flores bissexuais, brácteas e bractéolas presentes, crista dorsal das bractéolas ausentes. **Flores** escariosas, tépalas 5, fundidas na base; androceu com 5 estames, pseudoestaminódios ausentes, filetes unilobados, fundidos em tubo estaminal, tubo estaminal livre do perigônio, anteras monotecas; estilete bífido, estigma curto ou longo, ovário uniovulado. **Semente** vertical

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Restinga

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

### Possíveis ocorrências

Nordeste (Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe)

## CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

- Plantas com folhas linear-obovadas a liguladas; eixo principal da florescência suborbicular, até 1,0 cm compr.; tépalas com nervuras inconspícuas.....*B. portulacoides*
- 1'. Planta com folhas lanceoladas; eixo principal da florescência cilíndrico, 1,0-2,5 cm compr.; tépalas com nervuras conspícuas.....*B. vermiculare*



# *Blutaparon portulacoides* (A.St.-Hil.) Mears

## Tem como sinônimo

basiônimo *Philoxerus portulacoides* A. St.-Hil.

heterotípico *Iresine portulacoides* var. *commersoni* Moq.

heterotípico *Iresine portulacoides* (A. St.-Hil) Moq.

heterotípico *Telanthera philoxeroides* (Mart.) Moq.

## DESCRIÇÃO

**Folha:** folha(s) linear(es) - obovada(s) a(s) ligulada(s); **formato dos ápice(s) das folha(s)** agudo(s) ou obtuso(s); **ornamentação do ápice(s) das folha(s)** levemente cuspidado(s)/inteiro. **Inflorescência:** comprimento 0.5 - 1 cm de comprimento; **eixo principal da florescência** capituliforme(s)/suborbicular(es).

## DESCRIÇÃO ADICIONAL

**Ramos** 30-50 cm comprimento. **Folhas** levemente discolores, verdes, face abaxial mais clara, sésseis, linear-obovadas a liguladas, 1,5-3,0 × 0,3-0,5 cm, base atenuada, margem inteira, ápice agudo ou obtuso, levemente cuspidado ou inteiro. **Florescência** capituliforme, suborbicular, eixo principal da florescência 5,0-10,0 mm compr. **Flores** com bráctea e bractéolas desiguais; bráctea oval, côncava, 2,5-3,0 mm compr., base truncada, margem inteira, ápice agudo, inteiro, glabra; bractéolas elípticas, naviculares, 4,0-4,5 mm compr., base truncada, margem inteira, ápice agudo, inteiro, glabras; tépalas ovais, nervuras inconspícuas, três tépalas levemente côncavas, 4,0-4,5 mm compr., base truncada, margem inteira, ápice agudo, inteiro, duas naviculares, 3,8-4,0 mm compr., base truncada, margem inteira, ápice agudo, inteiro, glabras; tubo estaminal e filetes 2,4-3,0 mm compr., anteras oblongas, 0,5-0,8 mm compr.; ovário ovoide, 1,0-1,2 mm compr., estilete ca. 0,2 mm compr., estigma ca. 0,8 mm compr., papiloso.

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Restinga

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)

Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

## MATERIAL TESTEMUNHO

Gonçalves, P., s.n., PACA, Rio Grande do Sul

Korte, A., 5677, FURB,  (FURB00439)

## BIBLIOGRAFIA

Siqueira, J.C. 2002. Flora de São Paulo- Amaranthaceae.2:11-30.

# *Blutaparon vermiculare* (L.) Mears

## Tem como sinônimo

heterotípico *Iresine vermicularis* var. *aggregata* Moq.

heterotípico *Iresine vermicularis* var. *longespicata* Moq.

heterotípico *Iresine vermicularis* (L.) Moq.

## DESCRIÇÃO

**Folha:** folha(s) lanceolada(s); **formato dos ápice(s) das folha(s)** agudo(s); **ornamento do ápice(s) das folha(s)** mucronulado(s). **Inflorescência:** comprimento 1.5 - 2.5 cm de comprimento; **eixo principal da florescência** espiciforme.

## DESCRIÇÃO ADICIONAL

**Ramos** 20-30 cm comprimento. **Folhas** levemente discolores, verdes, face abaxial mais clara, sésseis a subsésseis, lanceoladas, 1,2-3,4 × 0,2-0,4 cm, base levemente atenuada a truncada, margem inteira, ápice agudo, mucronulado. **Florescência** espiciforme, eixo principal 1,0-2,5 cm comprimento. **Flores** com bráctea e bractéolas desiguais; bráctea oval, côncava, 1,5-2,1 mm compr., base truncada, margem inteira, ápice agudo, glabra; bractéolas ovais ou elípticas, naviculares, 2,2-3,0 mm compr., base truncada, margem inteira, ápice agudo, glabras; tépalas livres, desiguais, 3-nerviadas, sendo três tépalas oblongas, 2,0-3,5 mm compr., base truncada, margem inteira, ápice agudo ou truncado, duas elípticas, naviculares, 2,0-2,8 mm compr., nervuras conspícua, base truncada, margem inteira, ápice agudo, inteiro, pilosas nos 2/3 basais; tubo estaminal e filetes 0,5-1,7 mm compr., anteras oblongas, 0,5-0,9 mm compr.; ovário obloide, 0,6-1,0 mm compr., estilete curto, estigma ca. 0,5 mm compr., papiloso.

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Restinga

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Nordeste (Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí)

Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná)

### Possíveis ocorrências

Nordeste (Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe)

## MATERIAL TESTEMUNHO

Mattos, L.A., 837, MBM, Bahia

## BIBLIOGRAFIA

Mears, J.A. A summary of *Blutaparon* Rafinesque including species earlier known as *Philoxereus* R. Brown (Amarantaceae). *Taxon* 31(1): 113. 1982. *Taxon* 31(1): 111-117. 1982