

Briquetiastrum Bovini

Massimo G. Bovini

Jardim Botânico do Rio de Janeiro; bovinimassimo@gmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Briquetiastrum*, *Briquetiastrum spicatum*.

COMO CITAR

Bovini, M.G. 2020. *Briquetiastrum* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB583413>.

DESCRIÇÃO

Subarbusto a **arbusto**. **Ramos** eretos, raramente pêndulos. **Folhas** basais pecioladas, as apicais sésseis; lâmina foliar membranácea, discolors ou concolores, base cordada, ápice agudo, margem inteira, crenada ou serreada, ambas as faces pilosas. **Sinflorescência** frondo-bracteosas, laxas ou racemo congesto, contraído. **Flores** pediceladas; cálice com lobos partidos até a região mediana; corola amarela; ovário 5-13 locular, 2-3 óvulos por lóculo. **Esquizocarpo** 5-13 mericarpos, sem projeções basais, com endoglossa, paredes laterais reticuladas ou lisas, não perfuradas; 2-3 sementes.

COMENTÁRIO

Gênero neotropical muito semelhante a *Briquetia*, porém com 2-3 sementes e presença de endoglossa.

Forma de Vida

Arbusto, Subarbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação

Área Antrópica

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

BIBLIOGRAFIA

Bovini, M.G. 2015. *Briquetiastrum*: a new genus of Malvaceae and the redefinition of *Briquetia*. *Anales del Jardín Botánico de Madrid* 72(2): e022.

Briquetiastrum spicatum (Kunth in H.B.K.) Bovini

Tem como sinônimo

homotípico *Briquetia spicata* (Kunth) Fryxell

homotípico *Wissadula spicata* (H.B.K.) Fries

homotípico *Wissadula stellata* (H.B.K.) Fries

heterotípico *Briquetia brasiliensis* Fryxell

DESCRIÇÃO

Subarbusto a arbusto 1-2 m alt. **Ramos** eretos tomentosos, tricomas fasciculados e frequentemente simples longos. **Estípulas** 8-10 mm compr., lineares à levemente lanceolados, tricomas simples e raro fasciculados. **Folhas** basais com pecíolos até 20 cm compr., vilosas, tricomas simples longos e fasciculados menores, às vezes em direção ao ápice do ramo, as folhas tornam-se sésseis; lâmina foliar 4,5-21 x 4,5-19,5 cm, membranáceas, levemente discoloradas, às vezes levemente trilobada, base cordada, ápice agudo a acuminado, margem inteira, serreada ou crenada; face adaxial pubescente ou velutina, tricomas fasciculados; face abaxial velutina, tricomas fasciculados. **Sinflorescência** em racemo congesto e contraído, 10-20 cm compr.; antopódio ca. 2 mm compr., pubérulo. **Flores** com pedicelo ca. 2 mm compr., viloso, tricomas fasciculados; cálice 4 mm compr.; lobos partidos até a região mediana, tomentosos, tricomas simples e fasciculados; corola ca. 9 mm diâm., amarela; pétala vilosa na base; filetes parcialmente concrecidos ca. 1 mm, formando um tubo, e porção livre dos filetes 1-2 mm compr.; ovário 5-7 locular, 3 óvulos por lóculo; estilete ca. 3 mm compr. **Esquizocarpo** ca. 6 mm diâm., 5-(6) mericarpos, ca. 5 x 4 cm, sem projeções, divididos por uma endoglossa; paredes laterais lisas, glabrescentes, tricomas simples e fasciculados; 3 sementes, ca. 2 mm compr., 2 colaterais e 1 solitária, glabrescente, tricomas simples.

Forma de Vida

Arbusto, Subarbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação

Área Antrópica

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Bovini, M.G., 2766, RB, 479660, Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Briquetiastrum spicatum* (Kunth in H.B.K.) Bovini



Figura 2: *Briquetiastrum spicatum* (Kunth in H.B.K.) Bovini