

# *Browallia* L.

João Renato Stehmann

Universidade Federal de Minas Gerais; stehmann@ufmg.br

---

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Browallia*, *Browallia americana*, *Browallia speciosa*.

## COMO CITAR

Stehmann, J.R. 2020. *Browallia* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB14589>.

## DESCRIÇÃO

Ervas anuais, inermes, com tricomas simples, glandulares ou não. Folhas geminadas, mais raramente solitárias, alternas, inteiras, pecioladas. Flores solitárias, axilares, pedunculadas, pedúnculo articulado na base, bissexuadas, 5-meras, zigomorfas; cálice tubuloso, lobado; corola imbricada, hipocrateriforme, ápice ventricoso, limbo desigualmente 5-lobado; estames 4, didínamos, inclusos, filetes adnatos à corola na maior parte do comprimento, ápice curvado, anteras basifixas, rimosas, bitecas, tecas desiguais, disco nectarífero inconspícuo; ovário 2-locular, multiovulado, estilete reto, estigma alargado. Cápsula septifraga, 2-valvada, inclusa no cálice, pedúnculo ereto; sementes numerosas, prismáticas, foveoladas.

## Forma de Vida

Arbusto, Erva

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Naturalizada, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Campo de Altitude, Campo Rupestre

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia)

Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Santa Catarina)

## BIBLIOGRAFIA

Hunziker, A.T. 2001. Genera Solanacearum. The genera of Solanaceae illustrated, arranged according to a new system. Ruggell, A.R.G. Gantner Verlag.

# *Browallia americana L.*

## Tem como sinônimo

heterotípico *Browallia demissa* L.

heterotípico *Browallia elata* L.

heterotípico *Browallia linnaeana* Spreng.

## DESCRIÇÃO

**Erva** Erva até 0,6m de altura, ereta, ramos cilíndricos, esparso-pilosos. Pecíolo 0,5-2cm; lâmina 1,5-5,6 x 0,5-2,7cm, ovada ou ovada-elíptica, ápice agudo ou acuminado, base curto-atenuada, decurrente, estreitamente alada junto ao pecíolo, margem espessada, ciliada, face adaxial e abaxial esparso-pilosas. Flores azuladas ou esbranquiçadas, com centro esbranquiçado, pedicelo 3-6(-8)mm; cálice 6-7,5mm, costado, piloso, lobos 1,5-3mm; tubo da corola 15-16mm, externamente puberulento na base e junto à nervação, fauce esbranquiçada, limbo com lobos truncados; filetes maiores laminares, menores filamentosos, pilosos, anteras ca. 1mm; ovário basalmente glabro, velutino ou lanoso na metade superior, estigma 2-lobado. Cápsula ereta, 6-7x3,2-5mm, cálice persistente; sementes ca.0,5mm compr.

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Naturalizada, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Campo de Altitude, Campo Rupestre

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia)

Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Santa Catarina)

## MATERIAL TESTEMUNHO

Magalhães, G.M., 2848, BHCB,  (BHCB001849), Minas Gerais

F.C. Hoehne, 6102, SP, São Paulo

# *Browallia speciosa* Hook.

**Forma de Vida**

Arbusto

**Substrato**

Terrícola

**DISTRIBUIÇÃO**

Cultivada, não é endêmica do Brasil

**Tipos de Vegetação**

Área Antrópica