

Canavalia DC.

Cristiane Snak

Universidade do Estado de Santa Catarina; cristianesnak@gmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Canavalia*, *Canavalia bonariensis*, *Canavalia brasiliensis*, *Canavalia cassidea*, *Canavalia concinna*, *Canavalia dictyota*, *Canavalia dolichothyrsa*, *Canavalia ensiformis*, *Canavalia gladiata*, *Canavalia grandiflora*, *Canavalia llanorum*, *Canavalia mattogrossensis*, *Canavalia obidensis*, *Canavalia parviflora*, *Canavalia picta*, *Canavalia piperi*, *Canavalia reflexiflora*, *Canavalia rosea*, *Canavalia saueri*, *Canavalia sericophylla*.

COMO CITAR

Snak, C. 2020. *Canavalia* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB22854>.

Tem como sinônimo

heterotípico *Malocchia* Savi

heterotípico *Neurocarpum* Desv.

heterotípico *Wenderothia* Schltr.

DESCRIÇÃO

Liana, volúvel ou rastejante. **Folhas** pinadas, trifolioladas, estípulas e estipelas caducas. **Inflorescência** pseudoracemosa, axilar ou cauliflora. **Flores** ressupinadas; cálice bilabiado, lábio superior (vexilar) com dois lobos, lábio inferior (carenal) com três pequenos dentes livres ou parcialmente fundidos; corola papilionada, lilás, rosa, vermelha ou branca; pétalas unguiculadas; estandarte com aurículas na base da lâmina ou não; alas retorcidas ou não; pétalas da carena falcadas, retorcidas ou não, rostradas ou não, ápice arredondado, truncado, acuminado ou espiralado; estames 10, pseudomonadelfos, anteras dorsifixas; ovário estipitado, estigma capitado. **Legume** estipitado, lateralmente comprimido a túrgido, glabrescente a pubescente, deiscente ou indeiscente; cada valva com costelas ao longo das suturas, costelas adicionais presentes ou não. **Sementes** elipsoides a obloides ou reniformes, comprimidas ou não, geralmente castanhas, hilo linear, apêndice funicular persistente.

COMENTÁRIO

Canavalia possui cerca de 60 espécies e tem distribuição Pantropical. O centro de diversidade do grupo é a região Neotropical, onde estão presentes cerca de 40 espécies. No Brasil ocorrem 17 espécies, sendo o Cerrado e a Mata Atlântica os biomas que comportam a maior diversidade do gênero. As espécies do gênero podem ser caracterizadas pelo hábito lianescente, folhas trifolioladas, flores ressupinadas e cálice bilabiado, com o lábio superior bilobado maior que o inferior tridentado.

Forma de Vida

Erva, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Estacional Perenifólia, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Manguezal, Palmeiral, Restinga

Ilhas Oceânicas

Ocorrências confirmadas

Fernando de Noronha, Trindade

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

Possíveis ocorrências

Norte (Acre, Amapá, Rondônia, Roraima)

Nordeste (Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe)

Centro-Oeste (Goiás)

Sudeste (Espírito Santo)

Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folíolos com a face abaxial serícea, com tricomas prateados; legumes com costelas apenas ao longo das suturas, aladas *C. sericophylla*
- 1'. Folíolos com a face abaxial com indumento de outra forma, raramente serícea, tricomas brancos, amarelados, dourados ou castanhos; legumes com costelas apenas ao longo das suturas ou com uma costela extra, costelas não aladas 2
2. Dentes inferiores do cálice parcialmente fundidos; legumes com costelas apenas ao longo das suturas; sementes com o hilo circundando cerca da metade da circunferência da semente . 3
- 2'. Dentes inferiores do cálice livres; legumes com uma costela extra além das costelas ao longo das suturas; sementes com o hilo geralmente menor do que a metade da circunferência da semente 7
3. Cálice com lobos superiores mais largos do que longos, aresta superior do cálice (vexilar) fortemente côncava *C. cassidea*
- 3'. Cálice com lobos superiores mais longos do que largos ou tão longos quanto largos, aresta superior do cálice (vexilar) convexa, reta ou levemente côncava 4
4. Legumes indeiscentes, túrgidos; sementes geralmente globosas, não compressas.....
..... *C. bonariensis*
- 4'. Legumes deiscentes, compressos; sementes elipsoides a obloides, compressas 5
5. Cálice maior que 2,2 cm compr.; alas com um par de aurículas na base; sementes com hilo circundando cerca de 1/3 da circunferência da semente *C. dolichothyrsa*
- 5'. Cálice até 2 cm compr.; alas com uma aurícula na base; hilo circundando cerca da metade da circunferência da semente 6
6. Corola vermelha; estandarte reflexo; alas tão longas quanto o estandarte *C. reflexiflora*
- 6'. Corola rosada; estandarte não reflexo; alas mais curtas que o estandarte *C. parviflora*
7. Flores com as pétalas da carena não rostradas; estandarte com aurículas na base, alas e carena não retorcidas; legumes geralmente glabros ou glabrescentes 8
- 7'. Flores com as pétalas da carena rostradas; estandarte sem aurículas na base, alas e carena retorcidas; legumes geralmente pubescentes 13
8. Plantas que ocorrem geralmente na praia; folíolos suborbiculares a obovados, crassos, ápice geralmente emarginado (arredondado) *C. rosea*

- 8'. Plantas que ocorrem em outros habitats; folíolos lanceolados, elípticos, ovados a amplamente ovados, cartáceos, ápice agudo a acuminado 9
9. Folíolos e ramos jovens cobertos com tricomas brancos *C. piperi*
- 9'. Folíolos e ramos jovens geralmente glabros 10
10. Folíolos elípticos a lanceolados; sementes com hilo circundando cerca de 2/5 da circunferência da semente (quase a metade) *C. dictyota*
- 10'. Folíolos ovados a amplamente ovados; sementes com hilo circundando cerca de 1/5 da circunferência da semente 11
11. Legumes até 20 cm compr.; sementes até 2 cm de compr. (nativa) *C. brasiliensis*
- 11'. Legumes maiores que 20 cm compr.; sementes maiores que 2 cm compr. (cultivada) 12
12. Sementes brancas *C. ensiformis*
- 12'. Sementes vermelhas *C. gladiata*
13. Ápice da carena espiralado 14
- 13'. Ápice da carena truncado ou agudo 15
14. Folíolos membranáceos a cartáceos, pubescentes; corola menor que 2,5 cm compr.; ápice da carena com uma volta *C. picta* var. *elliptica*
- 14'. Folíolos cartáceos a coriáceos, glabros; corola maior que 3 cm compr., ápice da carena com ca. 2 voltas 15
15. Bractéolas com ápice agudo; legume seríceo *C. grandiflora*
15. Bractéolas com ápice obtuso; legume esparsamente piloso *C. saueri*
15. Legumes com as costelas expandidas *C. obidensis*
- 15'. Legumes com as costelas não expandidas 16
16. Lábio superior do cálice apiculado; legumes densamente pubescentes, tricomas ferrugíneos .
..... *C. picta*
- 16'. Lábio superior do cálice não apiculado; legumes glabrescentes a pubescentes, tricomas esbranquiçados 17
17. Folíolos obovados, raramente elípticos, ápice obtuso a emarginado; alas tão longas quanto a carena *C. mattogrossensis*
- 17'. Folíolos ovados a elípticos, raramente obovados, ápice agudo a acuminado; alas mais curtas que a carena 18
18. Folíolos com ápice acuminado, acumen maior que 10 mm, glabros; cálice menos que 1 cm compr. *C. concinna*
- 18'. Folíolos com ápice agudo a acuminado, acumen menor que 5 mm compr., pubescentes; cálice maior que 1,2 cm compr. (cultivada) *C. llanorum*

BIBLIOGRAFIA

- Aymard, G. & N. Cuelo. 1991. Catálogo y adiciones a las especies Neotropicales del género *Canavalia* (Leguminosae-Papilionoideae-Phaseoleae-Diocleinae). Pp. 45–64. In: R. E. Vargas, A. León & A. Escobar (eds). *Compilación de los trabajos presentados en el primer Seminario-Taller sobre Canavalia ensiformis*. Ceniap-Fonaiap-UCV, Maracay.
- Sauer, J. 1964. Revision of *Canavalia*. *Brittonia* 16 (2): 106-181.
- Snak, C. 2015. Filogenia e biogeografia de *Canavalia* Adans. (Leguminosae–Papilionoideae) e taxonomia das espécies Neotropicais. Tese de doutorado. Universidade Estadual de Feira de Santana, Brasil.
- Snak, C.; M. Vatanparast; C. Silva; G. P. Lewis; M. Lavin; T. Kajita & L. P. Queiroz. 2016. A dated phylogeny of the papilionoid legume genus *Canavalia* reveals recent diversification by a pantropical liana lineage. *Molecular phylogenetics and Evolution* 98: 133–146.

Canavalia bonariensis Lindl.

Tem como sinônimo

heterotípico *Canavalia paranensis* Hook. & Arn.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) volúvel(eis); **indumento** glabro(s)/glabrescente(s). **Folha:** folíolo(s) ovado(s); **ápice(s) dos folíolo(s)** acuminado(s)/agudo(s). **Inflorescência:** posição axilar(es). **Flor:** dente(s) inferior(es) do cálice(s) parcialmente fundido(s); **cor da corola** rosa/vermelha; **estandarte** com aurícula(s) na(s) base da lâmina(s); **ala(s)** não espiralada(s); **pétala(s) da carena(s)** não rostrada(s); **ápice(s) da carena(s)** truncado(s). **Fruto:** legume(s) túrgido(s); **indumento** glabro(s)/glabrescente(s); **deiscência** indeiscente(s); **valva(s) com costela(s) mediana(s)** ausente(s). **Semente:** forma obloide(s); **cor da semente(s)** castanha/vermelha.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Manguezal, Restinga

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sudeste (São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. Cordeiro, 787, HUEFS, MBM, ESA, 13881,  (ESA013881)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Canavalia bonariensis* Lindl.



Figura 2: *Canavalia bonariensis* Lindl.

BIBLIOGRAFIA

Sauer, J. Revision of *Canavalia*. Brittonia 16 (2): 106-181, 1964.

Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth.

Tem como sinônimo

heterotípico *Canavalia paraguayensis* Piper

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) volúvel(eis)/rastejante(s); **indumento** glabrescente(s)/pubescente(s). **Folha:** folíolo(s) elíptico(s)/ovado(s); **ápice(s) dos folíolo(s)** agudo(s)/obtusos(s). **Inflorescência:** posição axilar(es). **Flor:** dente(s) inferior(es) do cálice(s) livre(s); **cor da corola** lilás/rosa; **estandarte** com aurícula(s) na(s) base da lâmina(s); **ala(s)** não espiralada(s); **pétala(s) da carena(s)** não rostrada(s); **ápice(s) da carena(s)** arredondado(s)/truncado(s). **Fruto:** legume(s) lateralmente comprimido(s); **indumento** glabrescente(s); **deiscência** deiscente(s); **valva(s) com costela(s) mediana(s)** presente(s). **Semente:** forma elipsóide; **cor da semente(s)** castanha/enegrecida.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Palmeiral, Restinga

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)

Possíveis ocorrências

Norte (Amapá)

Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Schultze-Kraft, 850, HUEFS

L.P. Queiroz, 12676, HUEFS, 118173,  (HUEFS0118173), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Canavalia brasiliensis* Mart. ex Benth.



Figura 2: *Canavalia brasiliensis* Mart. ex Benth.

BIBLIOGRAFIA

Sauer, J. Revision of *Canavalia*. Brittonia 16 (2): 106-181, 1964.

Canavalia cassidea G.P.Lewis

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) volúvel(eis); **indumento** pubescente(s). **Folha:** folíolo(s) elíptico(s)/ovado(s); **ápice(s) dos folíolo(s)** acuminado(s). **Inflorescência:** posição axilar(es)/cauliflora(s). **Flor:** dente(s) inferior(es) do cálice(s) parcialmente fundido(s); **cor da corola** vermelha; **estandarte** com aurícula(s) na(s) base da lâmina(s); **ala(s)** não espiralada(s); **pétala(s) da carena(s)** não rostrada(s); **ápice(s) da carena(s)** arredondado(s). **Fruto:** legume(s) desconhecido(s); **indumento** desconhecido(s); **deiscência** desconhecido(s); **valva(s) com costela(s) mediana(s)** desconhecida(s). **Semente:** forma desconhecida(s); **cor da semente(s)** desconhecida(s).

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.A. Mori, 9293, CEPEC, K,  (K000082393), **Typus**

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Canavalia cassidea* G.P.Lewis



Figura 2: *Canavalia cassidea* G.P.Lewis

BIBLIOGRAFIA

Lewis, G.P. A New Species of *Canavalia* (Leguminosae: Papilionoideae) from Brazil. Kew Bull. 47: 305-307, 1992.

Canavalia concinna Sauer

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) volúvel(eis); **indumento** glabrescente(s)/pubescente(s). **Folha:** folíolo(s) elíptico(s); **ápice(s) dos folíolo(s)** acuminado(s). **Inflorescência:** posição axilar(es). **Flor:** dente(s) inferior(es) do cálice(s) livre(s); **cor da corola** rosa; **estandarte** sem aurícula(s) na(s) base da lâmina(s); **ala(s)** espiralada(s); **pétala(s) da carena(s)** rostrada(s); **ápice(s) da carena(s)** arredondado(s). **Fruto:** legume(s) lateralmente compresso(s); **indumento** pubescente(s); **deiscência** deiscente(s); **valva(s) com costela(s) mediana(s)** presente(s). **Semente:** forma elipsoide; **cor da semente(s)** castanha.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Cerrado

Tipos de Vegetação

Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.O.A. Malme, 3448, S (S-R-9714), R, S, **Typus**

BIBLIOGRAFIA

Sauer, J. Revision of *Canavalia*. Brittonia 16 (2): 106-181, 1964.

Canavalia dictyota Piper

Tem como sinônimo

heterotípico *Canavalia amazonica* Piper

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) volúvel(eis); **indumento** glabro(s)/glabrescente(s). **Folha:** folíolo(s) elíptico(s)/ovado(s); **ápice(s) dos folíolo(s)** agudo(s)/obtusos(s). **Inflorescência:** posição axilar(es). **Flor:** dente(s) inferior(es) do cálice(s) livre(s); **cor da corola** rosa; **estandarte** com aurícula(s) na(s) base da lâmina(s); **ala(s)** não espiralada(s); **pétala(s) da carena(s)** não rostrada(s); **ápice(s) da carena(s)** arredondado(s). **Fruto:** legume(s) lateralmente comprimido(s); **indumento** glabro(s); **deiscência** deiscente(s); **valva(s) com costela(s) mediana(s)** presente(s). **Semente:** forma elipsoide; **cor da semente(s)** castanha/enegrecida.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)

Nordeste (Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)

Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Spruce, 1468, K,  (K000502938), **Typus**

BIBLIOGRAFIA

Sauer, J. Revision of *Canavalia*. Brittonia 16 (2): 106-181, 1964.

Canavalia dolichothyrsa G.P.Lewis

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) volúvel(eis); **indumento** glabro(s). **Folha:** folíolo(s) elíptico(s)/ovado(s); **ápice(s) dos folíolo(s)** acuminado(s). **Inflorescência:** posição axilar(es)/cauliflora(s). **Flor:** dente(s) inferior(es) do cálice(s) parcialmente fundido(s); **cor da corola** lilás/rosa; **estandarte** com aurícula(s) na(s) base da lâmina(s); **ala(s)** não espiralada(s); **pétala(s) da carena(s)** não rostrada(s); **ápice(s) da carena(s)** arredondado(s). **Fruto:** legume(s) lateralmente compresso(s); **indumento** glabro(s); **deiscência** deiscente(s); **valva(s) com costela(s) mediana(s)** ausente(s). **Semente:** forma reniforme(s); **cor da semente(s)** castanha/enegrecida.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.A. Mori, 12008, CEPEC,  (CEPEC00016509), K,  (K000206642), K,  (K000082392), NY, MO, Bahia, **Typus**

BIBLIOGRAFIA

Lewis, G.P. & 't mannetje, L. Two New Species of Leguminosae: Papilionoideae from Bahia, Brazil. Kew Bull. 37: 123-127. 1982.

Canavalia ensiformis (L.) DC.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) volúvel(eis); **indumento** glabro(s)/glabrescente(s). **Folha:** folíolo(s) ovado(s); **ápice(s) dos folíolo(s)** agudo(s)/arredondado(s)/obtusos(s). **Inflorescência:** posição axilar(es)/cauliflora(s). **Flor:** dente(s) inferior(es) do cálice(s) livre(s); **cor da corola** rosa; **estandarte** com aurícula(s) na(s) base da lâmina(s); **ala(s)** não espiralada(s); **pétala(s) da carena(s)** não rostrada(s); **ápice(s) da carena(s)** arredondado(s). **Fruto:** legume(s) lateralmente compresso(s)/túrgido(s); **indumento** glabro(s)/glabrescente(s); **deiscência** deiscente(s); **valva(s) com costela(s) mediana(s)** presente(s). **Semente:** forma elipsoide; **cor da semente(s)** branca.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)

Possíveis ocorrências

Norte (Acre, Amapá, Rondônia, Roraima)
Nordeste (Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Sergipe)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Espírito Santo)
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 13180, K,  (K000930146), NY, 983087,  (NY00983087)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Canavalia ensiformis* (L.) DC.



Figura 2: *Canavalia ensiformis* (L.) DC.

BIBLIOGRAFIA

Sauer, J. Revision of *Canavalia*. Brittonia 16 (2): 106-181, 1964.

Canavalia gladiata (Jacq.) DC.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) volúvel(eis); **indumento** glabro(s)/glabrescente(s). **Folha:** folíolo(s) ovado(s); **ápice(s) dos folíolo(s)** agudo(s). **Inflorescência:** posição axilar(es)/cauliflora(s). **Flor:** dente(s) inferior(es) do cálice(s) livre(s); **cor da corola** lilás/rosa; **estandarte** com aurícula(s) na(s) base da lâmina(s); **ala(s)** não espiralada(s); **pétala(s) da carena(s)** não rostrada(s); **ápice(s) da carena(s)** arredondado(s). **Fruto:** legume(s) lateralmente compresso(s)/túrgido(s); **indumento** glabro(s)/glabrescente(s); **deiscência** deiscente(s); **valva(s) com costela(s) mediana(s)** presente(s). **Semente:** forma elipsoide; **cor da semente(s)** vermelha.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia, Ceará, Pernambuco)

Centro-Oeste (Distrito Federal)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná)

Possíveis ocorrências

Nordeste (Piauí)

Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.B.N. Bragança, s.n., RB, 242848,   (RB00170330)

A.F.M. Glaziou, 11902, R

BIBLIOGRAFIA

Sauer, J. Revision of *Canavalia*. Brittonia 16 (2): 106-181, 1964.

Canavalia grandiflora Benth.

Tem como sinônimo

homotípico *Wenderothia grandiflora* (Benth.) Piper

heterotípico *Canavalia albiflora* Ducke

heterotípico *Canavalia cuspidigera* Hoehne

heterotípico *Canavalia variicolor* Piper

Canavalia grandifolia Benth.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) volúvel(eis); **indumento** glabro(s)/glabrescente(s). **Folha:** folíolo(s) ovado(s)/obovado(s); **ápice(s) dos folíolo(s)** acuminado(s). **Inflorescência:** posição axilar(es). **Flor:** dente(s) inferior(es) do cálice(s) livre(s); **cor da corola** lilás; **estandarte** sem aurícula(s) na(s) base da lâmina(s); **ala(s)** espiralada(s); **pétala(s) da carena(s)** rostrada(s); **ápice(s) da carena(s)** espiralado(s). **Fruto:** legume(s) lateralmente compresso(s); **indumento** seríceo(s); **deiscência** deiscente(s); **valva(s) com costela(s) mediana(s)** presente(s). **Semente:** forma elipsoide; **cor da semente(s)** castanha.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação

Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Perenifólia, Palmeiral

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)

Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.B.E. Pohl, s.n., K,  (K000082400), **Typus**

BIBLIOGRAFIA

Sauer, J. Revision of *Canavalia*. Brittonia 16 (2): 106-181, 1964.

Canavalia llanorum Snak, Aymard & L.P.Queiroz

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) volúvel(eis); **indumento** pubescente(s). **Folha:** folíolo(s) elíptico(s)/ovado(s); **ápice(s) dos folíolo(s)** acuminado(s)/agudo(s). **Inflorescência:** posição axilar(es). **Flor:** dente(s) inferior(es) do cálice(s) livre(s); **cor da corola** branca; **estandarte** com aurícula(s) na(s) base da lâmina(s); **ala(s)** espiralada(s); **pétala(s) da carena(s)** rostrada(s); **ápice(s) da carena(s)** agudo(s). **Fruto:** legume(s) lateralmente compresso(s); **indumento** esparsamente piloso(s); **deiscência** deiscente(s); **valva(s) com costela(s) mediana(s)** presente(s). **Semente:** forma oblonga(s); **cor da semente(s)** castanha.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação

Área Antrópica

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Snak, C., 1073, HUEFS (HUEFS241156), **Typus**

BIBLIOGRAFIA

Snak et al. 2018. A New Species of Canavalia (Leguminosae, Papilionoideae) subgenus Wenderothia from the Colombian and Venezuelan Llanos. Brittonia. 70: 233—240. DOI: 10.1007/s12228-017-9512-2

Canavalia mattogrossensis (Barb.Rodr.) Malme

Tem como sinônimo

homotípico *Mucuna mattogrossensis* (Barb.Rodr.) Malme

homotípico *Wenderothia mattogrossensis* (Barb.Rodr.) Piper

heterotípico *Canavalia lasiocalyx* Kuntze

heterotípico *Wenderothia lasiocalyx* (Kuntze) Piper

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) volúvel(eis)/rastejante(s); **indumento** pubescente(s). **Folha:** folíolo(s) elíptico(s)/ovado(s)/obovado(s); **ápice(s) dos folíolo(s)** arredondado(s)/obtusos(s). **Inflorescência:** posição axilar(es). **Flor:** dente(s) inferior(es) do cálice(s) livre(s); **cor da corola** branca/lilás; **estandarte** sem aurícula(s) na(s) base da lâmina(s); **ala(s)** espiralada(s); **pétala(s) da carena(s)** rostrada(s); **ápice(s) da carena(s)** truncado(s). **Fruto:** legume(s) lateralmente comprimido(s); **indumento** pubescente(s); **deiscência** deiscente(s); **valva(s) com costela(s) mediana(s)** presente(s). **Semente:** forma elipsoide; **cor da semente(s)** castanha.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Cerrado, Pantanal

Tipos de Vegetação

Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

F.C. Hoehne, 2250, R

M.M.R.F. Melo, 380A, SP, 209274,  (SP026219), Paraná

G. Hatschbach, 74779, K (K000930141), Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Canavalia mattogrossensis* (Barb.Rodr.) Malme

BIBLIOGRAFIA

Sauer, J. Revision of *Canavalia*. Brittonia 16 (2): 106-181, 1964.

Canavalia obidensis Ducke

Tem como sinônimo

homotípico *Wenderothia obidensis* (Ducke) Piper

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) volúvel(eis); **indumento** glabrescente(s). **Folha:** folíolo(s) lanceolado(s)/oblongo(s); **ápice(s) dos folíolo(s)** acuminado(s)/obtusos(s). **Inflorescência:** posição axilar(es). **Flor:** dente(s) inferior(es) do cálice(s) livre(s); **cor da corola** lilás/rosa; **estandarte** sem aurícula(s) na(s) base da lâmina(s); **ala(s)** espiralada(s); **pétala(s) da carena(s)** rostrada(s); **ápice(s) da carena(s)** truncado(s). **Fruto:** legume(s) lateralmente comprimido(s); **indumento** esparsamente piloso(s); **deiscência** deiscente(s); **valva(s) com costela(s) mediana(s)** presente(s). **Semente:** forma elipsoide; **cor da semente(s)** enegrecida.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, 16336, MG, RB, 11810,  (RB00540161), **Typus**

BIBLIOGRAFIA

Sauer, J. Revision of *Canavalia*. Brittonia 16 (2): 106-181, 1964.

Canavalia parviflora Benth.

Tem como sinônimo

heterotípico *Canavalia versicolor* Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) volúvel(eis); **indumento** glabro(s). **Folha:** folíolo(s) elíptico(s)/ovado(s); **ápice(s) dos folíolo(s)** acuminado(s). **Inflorescência:** posição axilar(es). **Flor:** dente(s) inferior(es) do cálice(s) parcialmente fundido(s); **cor da corola** rosa; **estandarte** com aurícula(s) na(s) base da lâmina(s); **ala(s)** não espiralada(s); **pétala(s) da carena(s)** não rostrada(s); **ápice(s) da carena(s)** truncado(s). **Fruto:** legume(s) lateralmente compresso(s); **indumento** glabro(s); **deiscência** deiscente(s); **valva(s) com costela(s) mediana(s)** ausente(s). **Semente:** forma oblonga(s); **cor da semente(s)** castanha/enegrecida.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco)

Centro-Oeste (Distrito Federal)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.P. Queiroz, 2798, HUEFS, UEC

D.A. Folli, 5258, CVRD, 525391,  (RB00672047), Espírito Santo

L.P. Queiroz, 12275, HUEFS, 110684,  (HUEFS0110684), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Canavalia parviflora* Benth.

BIBLIOGRAFIA

Sauer, J. Revision of *Canavalia*. Brittonia 16 (2): 106-181, 1964.

Canavalia picta Mart. ex Benth.

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Canavalia picta*, *Canavalia picta* var. *elliptica*, *Canavalia picta* var. *picta*.

Tem como sinônimo

homotípico *Wenderothia picta* (Mart. ex Benth.) Piper

heterotípico *Wenderothia lenta* (Benth.) Piper

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) volúvel(eis); **indumento** glabro(s)/pubescente(s). **Folha:** folíolo(s) elíptico(s)/lanceolado(s)/ovado(s)/obovado(s); **ápice(s) dos folíolo(s)** agudo(s). **Inflorescência:** posição axilar(es). **Flor:** dente(s) inferior(es) do cálice(s) livre(s); **cor da corola** lilás; **estandarte** sem aurícula(s) na(s) base da lâmina(s); **ala(s)** espiralada(s); **pétala(s) da carena(s)** rostrada(s); **ápice(s) da carena(s)** acuminado(s)/espiralado(s). **Fruto:** legume(s) lateralmente compresso(s); **indumento** pubescente(s); **deiscência** deiscente(s); **valva(s) com costela(s) mediana(s)** presente(s). **Semente:** forma elipsoide; **cor da semente(s)** castanha.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Distrito Federal)

Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folíolos estreitamente ovado-lanceolados, geralmente até 15 cm; cálice 14 mm; plantas de terras baixas até 800 m de altitude.....*Canavalia picta* var. *picta*

1'. Folíolos elíptico-ovados ou às vezes obovados, 7#10 cm; cálice 8 mm; plantas de elevadas altitudes, 900#1.150 m de altitude.....*Canavalia picta* var. *elliptica*

(Modificado de Fantz, P.R. 1976. New Taxa of *Canavalia* Subgenus *Wenderothia* (Leguminosae) from Brazil. *Brittonia* 28: 81#85.)

MATERIAL TESTEMUNHO

F.C. Hoehne, s.n., HUEFS, 23676,  (HUEFS0023676), São Paulo

BIBLIOGRAFIA

Sauer, J. 1964. Revision of *Canavalia*. *Brittonia* 16 (2): 106-181.

Canavalia picta Mart. ex Benth. var. *picta*

Tem como sinônimo

homotípico *Wenderothia picta* (Mart. ex Benth.) Piper

heterotípico *Canavalia lenta* Benth.

heterotípico *Wenderothia lenta* (Benth.) Piper

DESCRIÇÃO

Caracteriza-se pelos folíolos estreitamente ovado-lanceolados, cálice ca. 15 mm e pétalas da carena com o rostro agudo.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Tamashiro, J.Y., 189, SP, HUEFS, UEC, SPF

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Canavalia picta* var. *picta* Mart. ex Benth.

BIBLIOGRAFIA

Sauer, J. 1964. Revision of *Canavalia*. *Brittonia* 16: 106-181.

Canavalia picta var. *elliptica* Fantz

DESCRIÇÃO

Caracteriza-se pelos folíolos elíptico-ovados ou obovados, cálice ca. 8 mm e pétalas da carena com o rostro espiralado.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Cerrado

Tipos de Vegetação

Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Distrito Federal)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.F. Ramos, 6626, K,  (K000082399), NY, Distrito Federal, **Typus**

D. Hunt, 6634, K

BIBLIOGRAFIA

Fantz, P. (1976) New Taxa of Canavalia Subgenus Wenderothia (Leguminosae) from Brazil. Brittonia 28: 81-85.

Canavalia piperi Killip & J.F. Macbr.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) volúvel(eis); **indumento** glabrescente(s)/pubescente(s). **Folha:** folíolo(s) ovado(s)/amplo ovado(s); **ápice(s) dos folíolo(s)** acuminado(s)/agudo(s)/obtusos(s). **Inflorescência:** posição axilar(es). **Flor:** dente(s) inferior(es) do cálice(s) livre(s); **cor da corola** rosa; **estandarte** com aurícula(s) na(s) base da lâmina(s); **ala(s)** não espiralada(s); **pétala(s) da carena(s)** não rostrada(s); **ápice(s) da carena(s)** truncado(s). **Fruto:** legume(s) lateralmente comprimido(s); **indumento** glabro(s); **deiscência** deiscente(s); **valva(s) com costela(s) mediana(s)** presente(s). **Semente:** forma elipsoide; **cor da semente(s)** castanha.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Cerrado

Tipos de Vegetação

Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Smith, 51, K, K,  (K000930145)

G. Hatschbach, 60799, K,  (K000930143)

BIBLIOGRAFIA

Sauer, J. Revision of *Canavalia*. Brittonia 16 (2): 106-181, 1964.

Canavalia reflexiflora Snak, G.P. Lewis & L.P. Queiroz

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) volúvel(eis); **indumento** glabrescente(s)/pubescente(s). **Folha:** folíolo(s) ovado(s)/amplo ovado(s); **ápice(s) dos folíolo(s)** acuminado(s)/cuspidado(s). **Inflorescência:** posição axilar(es)/cauliflora(s). **Flor:** dente(s) inferior(es) do cálice(s) parcialmente fundido(s); **cor da corola** vermelha; **estandarte** com aurícula(s) na(s) base da lâmina(s); **ala(s)** não espiralada(s); **pétala(s) da carena(s)** não rostrada(s); **ápice(s) da carena(s)** arredondado(s). **Fruto:** legume(s) lateralmente compresso(s)/túrgido(s); **indumento** glabro(s); **deiscência** deiscente(s); **valva(s) com costela(s) mediana(s)** ausente(s). **Semente:** forma oblonga(s); **cor da semente(s)** enegrecida.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Canavalia reflexiflora* Snak, G.P. Lewis & L.P. Queiroz



Figura 2: *Canavalia reflexiflora* Snak, G.P. Lewis & L.P. Queiroz



Figura 3: *Canavalia reflexiflora* Snak, G.P. Lewis & L.P. Queiroz



Figura 4: *Canavalia reflexiflora* Snak, G.P. Lewis & L.P. Queiroz

BIBLIOGRAFIA

Snak, C., G.P. Lewis, D.E. Rocha & L.P. Queiroz. 2015. A new species of *Canavalia* (Leguminosae, Papilionoideae) from Brazil with a specialized corolla suggesting bird pollination. *Phytotaxa* 207: 115–122.

Canavalia rosea (Sw.) DC.

Tem como sinônimo

homotípico *Dolichos roseus* Sw.

heterotípico *Canavalia maritima* (Aubl.) Thouars

heterotípico *Canavalia obtusifolia* var. *insularis* Ridl.

heterotípico *Canavalia obtusifolia* (Lam.) DC.

heterotípico *Dolichos littoralis* Vell.

heterotípico *Dolichos maritimus* Aubl.

heterotípico *Dolichos obtusifolius* Lam.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) rastejante(s); **indumento** glabrescente(s)/pubescente(s). **Folha:** folíolo(s) orbicular(es)/obovado(s); **ápice(s) dos folíolo(s)** arredondado(s)/emarginado(s). **Inflorescência:** posição axilar(es). **Flor:** dente(s) inferior(es) do cálice(s) livre(s); **cor da corola** rosa; **estandarte** com aurícula(s) na(s) base da lâmina(s); **ala(s)** não espiralada(s); **pétala(s) da carena(s)** não rostrada(s); **ápice(s) da carena(s)** arredondado(s). **Fruto:** legume(s) lateralmente compresso(s)/túrgido(s); **indumento** glabro(s); **deiscência** deiscente(s); **valva(s) com costela(s) mediana(s)** presente(s). **Semente:** forma elipsoide; **cor da semente(s)** castanha.

Forma de Vida

Erva, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Restinga

Ilhas Oceânicas

Ocorrências confirmadas

Fernando de Noronha, Trindade

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Pará)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)

Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

Possíveis ocorrências

Norte (Amapá)

Nordeste (Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.P. Bautista, 1052, HUEFS, HRB

Barbosa, E., 3, HUEFS (HUEFS034360), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Canavalia rosea* (Sw.) DC.

BIBLIOGRAFIA

Sauer, J. Revision of *Canavalia*. Brittonia 16 (2): 106-181, 1964.

Aymard C. *Canavalia rosea* (Sw.) DC. versus *Canavalia maritima* (Aubl.) Thouars. Ernstia 8(1): 19-25, 1998.

Canavalia saueri Fantz

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) volúvel(eis); **indumento** glabro(s)/glabrescente(s). **Folha:** folíolo(s) ovado(s); **ápice(s) dos folíolo(s)** agudo(s). **Inflorescência:** posição axilar(es). **Flor:** dente(s) inferior(es) do cálice(s) livre(s); **cor da corola** lilás; **estandarte** sem aurícula(s) na(s) base da lâmina(s); **ala(s)** espiralada(s); **pétala(s) da carena(s)** rostrada(s); **ápice(s) da carena(s)** espiralado(s). **Fruto:** legume(s) lateralmente compresso(s); **indumento** esparsamente piloso(s); **deiscência** deiscente(s); **valva(s) com costela(s) mediana(s)** presente(s). **Semente:** forma elipsóide; **cor da semente(s)** castanha.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Cerrado

Tipos de Vegetação

Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Palmeiral

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Hunt, 6098, K,  (K000082406), **Typus**

BIBLIOGRAFIA

Fantz, P. New Taxa of *Canavalia* Subgenus *Wenderothia* (Leguminosae) from Brazil. Brittonia 28: 81-85, 1976.

Canavalia sericophylla Ducke

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) volúvel(eis); **indumento** glabrescente(s)/pubescente(s). **Folha:** folíolo(s) elíptico(s)/ovado(s); **ápice(s) dos folíolo(s)** acuminado(s). **Inflorescência:** posição axilar(es). **Flor:** dente(s) inferior(es) do cálice(s) livre(s); **cor da corola** lilás/rosa; **estandarte** com aurícula(s) na(s) base da lâmina(s); **ala(s)** não espiralada(s); **pétala(s) da carena(s)** não rostrada(s); **ápice(s) da carena(s)** arredondado(s). **Fruto:** legume(s) lateralmente compresso(s); **indumento** glabro(s); **deiscência** deiscente(s); **valva(s) com costela(s) mediana(s)** ausente(s). **Semente:** forma elipsoide; **cor da semente(s)** castanha/enegrecida.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas)

Possíveis ocorrências

Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, 568, NY, 1302914,  (NY01302914), Amazonas

A. Ducke, 35476, K,  (K000082394), **Typus**

A. Ducke, s/n, RB, 35476,  (RB00540162), **Typus**

BIBLIOGRAFIA

Sauer, J. Revision of *Canavalia*. Brittonia 16 (2): 106-181, 1964.