

Cearanthes Ravenna

Julie Henriette Antoinette Dutilh

Universidade Estadual de Campinas; judutilh@yahoo.com

Antonio Campos Rocha

Universidade Estadual de Campinas; camposrocha@hotmail.com

Agostina Belén Sassone

Instituto Darwinion; asassone@darwin.edu.ar

Renata Souza de Oliveira

Universidade de São Paulo; rsolive1@gmail.com

Liliana Mónica Giussani

Instituto Darwinion; liligiussani@yahoo.com.ar

Alan W. Meerow

United States Department of Agriculture; griffinia@gmail.com

João Semir

Universidade Estadual de Campinas; semir@unicamp.br

Nathália Susin Streher

Universidade Estadual de Campinas; nathistreher@yahoo.com.br

Nicolás Garcia

University of Florida; nicogarciab@gmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Cearanthes*, *Cearanthes fuscoviolacea*.

COMO CITAR

Dutilh, J.H.A., Campos-Rocha, A., Sassone, A.B., Oliveira, R.S., Giussani, L.M., Meerow, A.W., Semir, J. (in memoriam), Streher, N.S., Garcia, N. 2020. *Cearanthes* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15452>.

DESCRIÇÃO

Geófito bulboso, folhas decíduas, pseudopetioladas; inflorescência multiflora, com duas brácteas espatáceas externas e duas internas maiores, lanceoladas, bracteolas internas pequenas, subuladas; flores pediceladas, infundibuliformes; estames patentes, estigma trifido

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Caatinga

Tipos de Vegetação

Carrasco

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Ceará, Piauí)

BIBLIOGRAFIA

Ravenna, P.F. 2000. Onira 5: 11

Cearanthes fuscoviolacea Ravenna

DESCRIÇÃO

Bulbo 3–4,5 cm comprimento. Folhas 1–3, pseudopecioladas; pseudopecíolo até 4 cm compr. Inflorescência 5–12 flores, pediceladas; escapo até 40 cm comprimento. Perianto 2,5–4 cm compr., infundibuliforme, lilás, base alva. . Estames 6, 0,6–2,1 cm compr. a partir do tubo do hipanto. Anteras 2–3 mm compr., cremes. Ovário 2,6–3,3 cm compr. Estilete até 2,8 cm compr. a partir do tubo do hipanto, pouco mais curto que o perianto, alvo, com pigmentação lilás na porção distal. Estigma trifido.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Caatinga

Tipos de Vegetação

Carrasco

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Ceará, Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Sucre, 10347, RB, 167196,  (RB00469667), Ceará, **Typus**