

Coutarea Aubl.

Maria Regina de Vasconcellos Barbosa

Universidade Federal da Paraíba; mregina@dse.ufpb.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Coutarea*, *Coutarea alba*, *Coutarea hexandra*.

COMO CITAR

Barbosa, M.R.V. 2020. *Coutarea* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB13914>.

Tem como sinônimo

homotípico *Cutaria* Brign.

heterotípico *Portlandia* P.Browne

DESCRIÇÃO

Árvores ou arbusto. Estípulas interpeciolares, triangulares, geralmente persistentes. Inflorescência terminal, pauciflora. Flores vistosas; botões curvos no ápice; cálice 5-7 laciniado; corola infundibuliforme ou campanulada, zigomorfa, curva na ponta, lacínios 5-7; estames 5-7, inseridos na base do tubo da corola, filetes longos, inclusos ou exsertos; ovário bilocular, óvulos numerosos, plantação axilar, estilete filiforme, estigma bifido. Cápsula lenhosa, septicida, comprimida lateralmente, elíptica ou orbicular; sementes numerosas, comprimidas, aladas.

Forma de Vida

Arbusto, Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação

Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila Mista, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. fruto castanho-avermelhado, com lenticelas numerosas, circulares... *Coutarea alba*

1'. fruto castanho-escuro ou preto, sem ou poucas lenticelas, elípticas...*Coutarea hexandra*

BIBLIOGRAFIA

Aublet. Histoire des Plantes de la Guiane Françoise 1: 314, t. 122. 1775.

Taylor, C. M. & D. H. Lorence. 2010. Rubiacearum americanarum magna hama pars XXII: Notable new species of South American *Coutarea*, *Morinda*, *Patima*, and *Rosenbergiodendron*. *Novon* 20(1): 95–105.

Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. 29 Jun 2018 <<http://www.tropicos.org/Name/40015606>>

Coutarea alba Griseb.

DESCRIÇÃO

Flor: lacínia(s) cálice(s) lanceolado(s) - filiforme(s); **tubo da corola** incurvado(s) clavado(s); **pétala(s)** branca. **Fruto:** cor castanho - avermelhado; **lenticela(s)** numerosa(s) circular(es).

Forma de Vida

Arbusto, Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas


Norte (Roraima)


Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.B.O.S. Cardoso, 491, NY, 1146338,  (NY01146338), Bahia

G. C. P. Pinto, s.n., NY, 397105,  (NY00397105), Bahia

Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Coutarea hexandra*, .

Tem como sinônimo

basiônimo *Portlandia hexandra* Jacq.
 homotípico *Coutarea hexandra* var. *typica* K.Schum.
 heterotípico *Cinchona souzana* (Mart.) Brign.
 heterotípico *Coutarea campanilla* DC.
 heterotípico *Coutarea corymbosa* Brign.
 heterotípico *Coutarea flavescens* Sessé & Moc. ex DC.
 heterotípico *Coutarea hexandra* var. *amazonensis* (Jacq.) K.Schum.
 heterotípico *Coutarea hexandra* var. *amazonica* K.Schum.
 heterotípico *Coutarea hexandra* var. *calycina* Chodat & Hassl.
 heterotípico *Coutarea hexandra* var. *campanilla* (DC.) Steyerem.
 heterotípico *Coutarea hexandra* var. *fluminensis* K.Schum.
 heterotípico *Coutarea hexandra* var. *pubescens* (Pohl) K.Schum.
 heterotípico *Coutarea hexandra* var. *speciosa* (Aubl.) K.Schum.
 heterotípico *Coutarea lindeniana* Baill.
 heterotípico *Coutarea mollis* Cham.
 heterotípico *Coutarea portlandia* Dum.Cours.
 heterotípico *Coutarea pubescens* Pohl
 heterotípico *Coutarea scherffiana* André
 heterotípico *Coutarea speciosa* Aubl.
 heterotípico *Exostema souzanum* Mart.
 heterotípico *Gardenia hexagona* Lem.
 heterotípico *Portlandia acuminata* Willd. ex Schult.
 heterotípico *Portlandia speciosa* Baill.

DESCRIÇÃO

Flor: lacínia(s) cálice(s) arredondado(s); **tubo da corola** tubular(es) campanulado(s); **pétala(s)** rósea. **Fruto:** cor castanho escuro ou preto; **lenticela(s)** sem ou poucas elíptica(s).

Forma de Vida

Arbusto, Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação

Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila Mista



Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
 Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
 Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
 Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 6122, CEPEC,  (CEPEC00017621), Bahia
C. Ferreira, 8403, INPA
O.C.Góes, 37, RB, 140586,  (RB00341339)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Coutarea hexandra* (Jacq.) K.Schum.



Figura 2: *Coutarea hexandra* (Jacq.) K.Schum.



Figura 3: *Coutarea hexandra* (Jacq.) K.Schum.

BIBLIOGRAFIA

Delprete & Cortés-B. Rev. Biol. Neotrop.3(1): 13-96. 2006.