

# *Deschampsia* (L.) P.Beauv.

Liliana Essi

Universidade Federal de Santa Maria; liliana.essi@ufsm.br

Leonardo Nogueira da Silva

Universidade Federal do Rio Grande do Sul; nogueira.silva@ufrgs.br

---

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Deschampsia*, *Deschampsia cespitosa*.

## COMO CITAR

Essi, L., da Silva, L.N. 2020. *Deschampsia* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB108738>.

## DESCRIÇÃO

### DESCHAMPSIA (L.) P. BEAUV.

**Plantas** perenes, cespitosas. **Bainhas** foliares abertas. **Lâminas** foliares planas, conduplicadas ou convolutas, glabras ou pubescentes, aurícula ausente; lígula membranosa. **Panícula** aberta a contraída. **Espiguetas** basítonas, bifloras; ráquila articulada acima das glumas, bem desenvolvida e pilosa, estendendo-se além do antécio superior; glumas geralmente maiores que os antécios, 1 - 3-nervadas, iguais a desiguais; lemas 3 - 5-nervados, membranosos, aristados, arista dorsal; páleas biquilhadas. **Estames** 3; ovário glabro, estiletes apicais. **Cariopse** ovoide com hilo elíptico.

### Forma de Vida

Erva

### Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

### Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

### Tipos de Vegetação

Campo de Altitude

### Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

## BIBLIOGRAFIA

Chiapella, J. & Zuloaga, F. 2010. A revision of *Deschampsia*, *Avenella*, and *Vahlodea* (Poaceae, Poaeae, Airinae) in South America. *Annals of the Missouri Botanical Garden*, 97 (2): 141-162.

# *Deschampsia cespitosa* (L.) P. Beauv.

## DESCRIÇÃO

***Deschampsia caespitosa*** (L.) P. Beauv.

**Plantas** perenes, cespitosas, 25 - 100 cm. **Lâminas** foliares 8 - 20 cm X 1,5 - 4 mm, superfície adaxial escabra, e a abaxial glabra; lígula 2 - 12 mm. **Panicula** aberta. **Espiguetas** 4 - 5,5 mm; glumas agudas, 1 - 3-nervadas, subiguais, lemas membranosos, escabros ou lisos, aristados, arista dorsal, 1,5 - 5,5 mm, 4- denticulados, páleas membranosas, quilhas escabras. **Cariopse** com hilo elíptico.

*Nome popular.* Aveia-de-burro

*Nota.* Floresce entre dezembro e maio. Embora possua distribuição ampla, com ocorrência na Europa, Ásia e América, no Brasil é considerada rara, restrita a campos de altitude. Chiapella & Zuloaga (2010) aceitam duas variedades para a América do Sul, a variedade típica e *Deschampsia cespitosa* var. *pulchra* (Nees & Meyen) Nicora. Com relação às lâminas foliares, relata-se que as nervuras são em geral bem marcadas, mas esse caráter é de difícil observação em material herborizado.

Referência:

Chiapella, J. & Zuloaga, F. 2010. A revision of *Deschampsia*, *Avenella*, and *Vahlodea* (Poaceae, Poaeae, Airinae) in South America. *Annals of the Missouri Botanical Garden*, 97 (2): 141-162.

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação


Campo de Altitude

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

## MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 30762, UEC, 16855,  (UEC048385), Paraná

H.M. Longhi-Wagner, 2654, FURB (FURB03091), Rio Grande do Sul

A.R. Reitz, 2966, HRB, US, Santa Catarina

## BIBLIOGRAFIA

CHIAPPELLA, J. & ZULOAGA, F. 2010. A revision of *Deschampsia*, *Avenella*, and *Vahlodea* (Poaceae, Poaeae, Airinae) in South America. *Annals of the Missouri Botanical Garden*, 97 (2): 141-162.

SMITH, L.B., WASSHAUSEN, D.C. & KLEIN, R.M. 1982. Gramíneas. In: R. REITZ (ed.). *Flora Ilustrada Catarinense*, Itajaí, Herb. Barbosa Rodrigues.