

Enteropogon Nees

Jefferson Rodrigues Maciel

Jardim Botânico de Recife; jeff.r.maciell@gmail.com

Jose Francisco Montenegro Valls

EMBRAPA; jose.valls@embrapa.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Enteropogon*, *Enteropogon mollis*.

COMO CITAR

Maciel, J.R., Valls, J.F.M. 2020. *Enteropogon* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB20374>.

DESCRIÇÃO

Ervas anuais; cespitosas; colmo glabro, nós glabros. Folhas dísticas ao longo do colmo; bainha foliar glabra; lígula ciliada; lâmina foliar linear a linear lanceolada, aguda, pubescente, plana. Panícula estramínea, racemosa, laxa, hermafrodita, com 3–7 ramos, digitados ou subdigitados, bilateral, espiciformes, pendentes, flexuosos, com um ramo antecedendo de racemos. Espiguetas basítonas com 2 antécios, solitárias, linear, paleácea; gluma inferior presente, aristulada, glabra; gluma superior aristulada, glabra; antécio inferior hermafrodita, lema inferior glabro e aristado, antécio superior neutro, paleáceo, lema superior com ápice aristado, ápice do lema não voltado para fora da espiguetas, pálea sem cílios evidentes.

COMENTÁRIO

Na atual circunscrição baseada em evidências morfológicas o gênero possui 18 espécies que ocorrem na Europa, Ásia, África, Oceania, América do Norte, América Central e América do Sul. Na América do Sul são registradas quatro espécies. As evidências moleculares sugerem que a atual circunscrição do gênero não representa um táxon monofilético. A única espécie registrada para o Brasil está mais relacionada à algumas espécies de *Chloris* e *Leptochloa*.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Caatinga

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Carrasco, Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

Sudeste (Minas Gerais)

Enteropogon mollis (Nees) Clayton

DESCRIÇÃO

Colmo 40-70 cm, ereto. **Bainha foliar** glabra; lígula 1 mm; lâmina foliar 8-14,5 x 0,2-0,4 cm. Inflorescências racemosa com racemos de 6-9 cm de comprimento. **Espiguetas** 8-12,5 mm, 2-antécios; antécios lateralmente comprimidos. Cariopse linear, achatada, ca. de 3 mm de comprimento.

COMENTÁRIO

Ocorre na América Central, Equador e Brasil. No Brasil sua distribuição é restrita ao semi-árido onde é encontrada em solos arenosos ou pedregosos muito frequentemente. Seus uso econômico é desconhecido.

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Caatinga

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Carrasco, Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas


Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

Sudeste (Minas Gerais)


MATERIAL TESTEMUNHO


P. Luetzelburg, 23511, CEN, 11837, IPA, 21714, Paraíba


J.R. Swallen, 4196, K (K000003273), Piauí


A. Löfgren, s.n., RB, 78860,  (RB00616258), Bahia


C.G.T. Ferreira, 137, UFP, 55577, RB, 489501,  (RB00575948), MOSS, 8277, Rio Grande do Norte

J.R. Maciel et al., 182, ASE, 16652, RB, 499811,  (RB00592934), Pernambuco

Pe. José Eugenio, S.J., 303, RB, 80723,  (RB00616288), Ceará

G. Eiten & L. T. Eiten, 4503, NY, 862468,  (NY00862468), Maranhão

G. Eiten & L. T. Eiten, 4981, NY, 650249,  (NY00650249), MO, 1921038, Bahia

H.N. Ridley et al., 165A, K,  (K000003280), Pernambuco, **Typus**

M.C.H. Mamede, 400, EAC, 50405, Ceará