

Froelichiella R.E.Fr.

Luisa Ramos Senna Souza

Instituto Federal da Bahia; luisasenna@gmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Froelichiella*, *Froelichiella grisea*.

COMO CITAR

L.R. Senna 2020. *Froelichiella* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB26332>.

DESCRIÇÃO

Erva ou subarbusto, perene, caule não suculento. **Planta** monoica com folhas opostas, esparsas, raramente adensadas na base do caule, inteiras. **Florescências** pedunculadas, laxas ou densas, dicásios sem flores modificadas, flores bissexuais, bráctea e bractéolas presentes, bractéolas sem crista dorsal. **Flores** membranáceas, tépalas 5, fundidas na base; androceu com 5 estames, pseudoestaminódios presentes, filetes unilobados, fundidos em tubo estaminal, anteras monotecas, tubo estaminal livre do perigônio; estigma multilobado (parecendo penicilado), estilete curto, ovário uniovulado. **Semente** vertical.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Cerrado

Tipos de Vegetação

Campo Rupestre

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Goiás)

Froelichiella grisea R.E.Fr.

Tem como sinônimo

basiônimo *Gomphrena grisea* Lopr.

DESCRIÇÃO

Ervas, 0,2-0,4 m alt., ramos procumbentes ou eretos, indumentados, vilosos com tricomas simples. **Folhas** rosuladas na base e opostas nos ramos, membranáceas, descolores, face abaxial esbranquiçada, face adaxial verde, lineares, oblongas, obovadas ou clavadas, 2-2,5 x 0,5-1 cm, base truncada, ápice agudo ou obtuso, mucronado, face abaxial lanosa, adaxial glabra. **Florescência** com paracládios espiciformes, 2,5-3 cm compr., pedunculados, pedúnculos 11-15 cm compr., vilosos. **Flores** acinzentadas com tons avermelhados; bráctea e bractéolas iguais entre si, globosas, 5-5,2 mm compr., base truncada, margem inteira, ápice obtuso, inteiro ou retuso, glabras; tépalas, elípticas, 8-9 mm compr., lanosas na base, tricomas simples; tubo estaminal e filetes ca. 6 mm compr., prolongamento do tubo estaminal denteado na porção distal, filetes laterais acima do filete anterífero, denteados, filete anterífero curto, anteras oblongas, 1-1,2 mm compr.; ovário elipsóide, ca. 0,3 mm compr., estilete curto e pouco diferenciado, estigma bifido e penicelado.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Cerrado

Tipos de Vegetação

Campo Rupestre

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 37210, MBM, Goiás

BIBLIOGRAFIA

Marchioretto, M. S., Windisch, P.G. & Siqueira, J.C. 2002. Os gêneros *Froelichia* Moench e *Froelichiella* R.R.Fr. (Amaranthaceae) no Brasil. *Pesquisas, Botânica* 52:7-46.