

Froesiochloa G.A.Black

Reyjane Patrícia Oliveira

Universidade Estadual de Feira de Santana; rpatricia@uefs.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Froesiochloa*, *Froesiochloa boutelouoides*.

COMO CITAR

Oliveira, R.P. 2020. *Froesiochloa* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB121792>.

DESCRIÇÃO

Plantas pequenas, formando touceiras perenes. Colmos eretos, monomórficos, lâminas foliares densamente agrupadas no ápice dos colmos, dando uma aparência palmada; lâminas lanceoladas até oval-lanceoladas, pseudopeciouladas, assimétricas, decíduas. Inflorescências terminais, compostas por grupos parciais de numerosas espiguetas masculinas que se agrupam congestionadamente em torno de cada espiguetas feminina, sendo essas estruturas parciais decíduas e dispostas em zig zague ao longo do eixo da inflorescência. Espiguetas femininas lanceoladas, muito maiores que as masculinas, glumas subiguais, firmes; antécio elíptico, liso, densamente pubescente; espiguetas masculinas lanceoladas, persistentes. Estames 3, filetes formando um tubo.

COMENTÁRIO

Froesiochloa é um gênero monotípico, incluindo apenas *F. boutelouoides* G.A. Black em sua delimitação. Sua distribuição é conhecida da Guiana Francesa e Norte do Brasil, pouco representado nas coleções de herbário. Suas relações dentro de Olyreae são incertas, sendo alvo de estudos em andamento.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amapá, Pará)

Possíveis ocorrências

Nordeste (Maranhão)

BIBLIOGRAFIA

Black, G.A. 1950. Novas espécies de Paniceae (Gramineae) do Brasil. Boletim técnico do Instituto Agronômico do Norte 20: 29-31.

Judziewicz, E.J., Clark, L.G., Londoño, X., Stern, M.J. 1999. American bamboos. Smithsonian Institution Press, Washington, DC, 392 pp.

Froesiochloa boutelouoides G.A.Black

COMENTÁRIO

Apresenta folhas lanceoladas a oval-lanceoladas, densamente agrupadas no ápice dos colmos. As sinflorescências são terminais, bastante distintas dos demais gêneros de bambus herbáceos. Em cada uma delas, numerosas espiguetas masculinas são congestionadamente agrupadas em torno de uma única e bem desenvolvida espiguetas feminina, sendo essa estrutura decídua e distribuída em zig zag ao longo do eixo da inflorescência. Os filetes formando um tubo também são característicos do gênero, que é monoespecífico.

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amapá, Pará)

Possíveis ocorrências

Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

Calderon, C.E., 2273, MO, Amapá

R.L. Fróes, 25861, IAN

Calderon, C.E., 2273, K,  (K000997243), IAN (IAN097280), NY (NY02618111), K (K000997243), Amapá

Fróes, RL, 32809, IAN (IAN097280), Pará

BIBLIOGRAFIA

Judziewicz, E.J., Clark, L.G., Londoño, X., Stern, M.J. 1999. American bamboos. Smithsonian Institution Press, Washington, DC, 392 pp.