

Kefersteinia Rchb.f.

Thiago Erir Cadete Meneguzzo

Jardim Botânico do Rio de Janeiro; botanica@meneguzzo.net.br

Climbiê Ferreira Hall

Museu Paraense Emílio Goeldi; climbiehall@yahoo.com.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Kefersteinia*, *Kefersteinia mystacina*.

COMO CITAR

Meneguzzo, T.E.C., Hall, C.F. 2020. *Kefersteinia* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB604928>.

DESCRIÇÃO

Plantas cespitosas. Folhas conduplicadas. Inflorescência uniflora e com duas bractéolas por flor. Flores ressupinadas ou não.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Possíveis ocorrências

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)

Kefersteinia mystacina Rchb.f.

Tem como sinônimo

homotípico *Zygopetalum mystacinum* Rchb.f.

heterotípico *Kefersteinia lacerata* Fowlie

DESCRIÇÃO

Flores brancas, labelo lacerado.

COMENTÁRIO

Material testemunho existente, porém não localizado no herbário MG (confirmado pelo coletor João Batista Fernandes da Silva, comunicação pessoal).

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Possíveis ocorrências

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)