

Kegeliella Mansf.

Cássio van den Berg

Universidade Estadual de Feira de Santana; vcassio@gmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Kegeliella*, *Kegeliella houtteana*.

COMO CITAR

van den Berg, C. 2020. *Kegeliella* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB37714>.

Tem como sinônimo

basiônimo *Kegelia* Rchb.f.

DESCRIÇÃO

Ervas epífitas cespitosas. *Pseudobulbos* achatados ou quadrangulares. *Folhas* 2, elípticas, subsésseis, verdes tingidas de púrpura na face abaxial, com veias aparentes. *Inflorescência* racemosa simples, lateral ao pseudobulbo, pendente, coberta de pelos escuros, com brácteas conspicuas, até 10-12 flores. *Flores* pequenas entre os gêneros de Stanhopeinae, *sépalas* livres, côncavas, lanceoladas de ápice agudo ou acuminado, *pétalas* similares porém mais estreitas que as sépalas, curvadas para frente, *labelo* carnoso, unguiculato, trilobado, *coluna* verde, com a base estreita e ápice amplamente dilatado lateralmente, *polinário* com viscido triangular, estipe longo e duas polínias oblongas achatadas lateralmente.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amapá)

BIBLIOGRAFIA

Mansfeld, R. (1934) IV. Orchideologische Mitteilungen. II. *Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis* 36: 58-64.

Kegeliella houtteana (Rchb.f.)

L.O. Williams

Tem como sinônimo

basiônimo *Kegelia houtteana* Rchb.f.

DESCRIÇÃO

Ervas epífitas, pseudobulbos ovóides, lateralmente comprimidos. Folhas 3, elíptico-lanceoladas, plicadas, 9-13 cm compr. Inflorescência pendente, racemosa, pauciflora, ca. 10 cm compr. Sépalas e pétalas, verde-ocre com linhas transversais marrom-avermelhado, sépalas lanceoladas, acuminadas, côncavas, pétalas lanceoladas acuminadas, menores que as sépalas, labelo amarelo claro, trilobado, lobos laterais subdolabriformes, lobo mediano triangular a subcordado, coluna longa, verde-esmeralda, com alas muito conspícuas próximas do ápice.

COMENTÁRIO

Kegeliella houtteana é a única espécie do gênero que ocorre no Brasil, similar a espécies de *Polycynis* vegetativamente, porém facilmente diferenciada na estrutura floral. A coluna verde, com alas muito grandes na extremidade é um caráter fácil para sua identificação. De coleta muito rara, tem alguns registros para a Guiana Francesa e no Brasil apenas para o Amapá. O espécime do HB não consta no banco de dados do species link.

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amapá)

MATERIAL TESTEMUNHO

Malme, G.O.A., s.n., HB, 1799

BIBLIOGRAFIA

Williams, L.O. (1942). Orchidaceae. Pp. 336-350 in Woodson, R.E. & Schery, R.W. Contributions toward a flora of Panama. *Annals of Missouri Botanical Garden* 29: 317- 379.