

Krukoviella A.C.Sm.

Roberta Gomes Chacon

rgchacon@gmail.com

Fernanda Oliveira Silva

Museu Paraense Emílio Goeldi; oliveirafs.2@gmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Krukoviella*, *Krukoviella disticha*.

COMO CITAR

Chacon, R.G., Silva, F.O. 2020. *Krukoviella* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB86114>.

Tem como sinônimo

basiônimo *Planchonella* Tiegh.

homotípico *Godoya* Ule

DESCRIÇÃO

Arbusto escandente, estípulas presentes. Folhas pecioladas; lâminas glabras, coriáceas, obovais ou oblongas, margens revolutas, nervuras terciárias reticuladas. Panículas densas, terminais. Flores amarelas, estames com antera poricida; ovário estreito-oblongo, estigmas 5. Fruto ereto ou falcado, linear-fusiforme.

Forma de Vida

Arbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas)

Krukoviella disticha (Tiegh.) Dwyer

Tem como sinônimo

basiônimo *Planchonella disticha* Tiegh.

homotípico *Godoya disticha* (Tiegh.) Ule

heterotípico *Krukoviella scandens* A.C.Smith

DESCRIÇÃO

Arbusto, estípulas coriáceas, ca. 8mm. Pecíolos glabros 4-6mm; lâminas glabras, vistosas, pouco coriáceas, obovais ou oblongas, 4-16 x 2-8 cm, ápice obtuso, base cuneada ou obtusa, nervura principal proeminente em ambas as faces, nervuras secundárias 9-18, conspicuas, subplana, margens revolutas. Panículas densas, terminais, raque 6-17 cm compr.; pedicelo 0,7-1 cm. Sépalas subiguais, coriáceas, glabras, côncavas, ovais, oval-rotunda ou oval-oblonga, 3-4 mm, margem inteira; pétalas amarelas, carnosas, obovais ou obdeltóides, 9-13 x 6-8 mm, ápice obtuso; estames com filetes delgado, ca. 1/3 do comprimento da antera, antera linear-oblonga, 4-5.5 mm compr., poricida, obtuso-cuspidada no ápice, pouco auriculada na base; ovário crasso, verrucoso, estreito-oblongo, 7,5-9 x 2-2,5 mm, estilete < 5 mm, estigmas 5, branco, sésseis. Fruto ereto ou falcado, linear-fusiforme, 3 mm compr.

Forma de Vida

Arbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação




Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica



Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, 1839, RB, INPA, RB, 60319,    (RB00680456)

A. Ducke, 1839, K,  (K000382263)

R. Spruce, 4003, K,  (K000201278), K,  (K000201324), **Typus**