

Leptospron (Benth.) A. Delgado

Cristiane Snak

Universidade do Estado de Santa Catarina; cristianesnak@gmail.com

Alfonso Delgado-Salinas

Universidad Nacional Autónoma de México; adelgado@ib.unam.mx

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Leptospron*, *Leptospron adenanthum*.

COMO CITAR

Snak, C., Delgado-Salinas, A. 2020. *Leptospron* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB136528>.

DESCRIÇÃO

Ervas, ramos prostrados ou volúveis. Estípulas e estipelas não prolongadas abaixo do ponto de inserção (não auriculadas), caducas. **Folhas** pinadas, trifolioladas. **Inflorescência** pseudoracemosa, axilar. **Flores** com cálice campanulado, 4-dentado; corola branca a creme, alas com estrias roxas, pétalas unguiculadas; pétalas da carena cocleadas; estames 10, diadelfos; ovário glabrescente a pubescente; estilete barbado, estigma terminal, capitado. **Legumes** lineares, compressos, rostrados, deiscentes; valvas com as margens espessadas. **Sementes** castanhas ou negras.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará, Tocantins)

Nordeste (Bahia)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

Leptospron adenanthum (G.Mey.) A. Delgado

Tem como sinônimo

basiônimo *Phaseolus adenanthus* G.Mey.
 homotípico *Vigna adenantha* (G.Mey.) Maréchal et al.
 heterotípico *Phaseolus adenanthus* var. *caeduorum* Hassl.
 heterotípico *Phaseolus adenanthus* var. *caeduosus* (Mart. ex Benth.) Hassl.
 heterotípico *Phaseolus adenanthus* var. *genuinus* Hassl.
 heterotípico *Phaseolus adenanthus* var. *latifolius* (Benth.) Hassl.
 heterotípico *Phaseolus adenanthus* var. *radicans* (Benth.) Hassl.
 heterotípico *Phaseolus adenanthus* var. *truxillensis* (Kunth) Hassl.
 heterotípico *Phaseolus alatus* Roxb.
 heterotípico *Phaseolus amoenus* Macfad.
 heterotípico *Phaseolus barbulatus* Benth.
 heterotípico *Phaseolus brevipes* Benth.
 heterotípico *Phaseolus caeduorum* Mart. ex Benth.
 heterotípico *Phaseolus cirrhosus* Kunth
 heterotípico *Phaseolus cirrosus* Kunth
 heterotípico *Phaseolus cochleatus* Bello
 heterotípico *Phaseolus cuernavacanus* Rose
 heterotípico *Phaseolus cumingii* Benth.
 heterotípico *Phaseolus cumingii* Benth.
 heterotípico *Phaseolus latifolius* Benth.
 heterotípico *Phaseolus macfadyeni* Steud.
 heterotípico *Phaseolus occidentalis* Rose
 heterotípico *Phaseolus radicans* Benth.
 heterotípico *Phaseolus rostratus* Wall.
 heterotípico *Phaseolus speciosus* Bojer ex Benth.
 heterotípico *Phaseolus subtortus* Benth.
 heterotípico *Phaseolus surinamensis* Miq.
 heterotípico *Phaseolus truxillensis* Kunth

DESCRIÇÃO

Ervas, ramos prostados ou volúveis, pubérulos a pubescentes. **Estípulas** 3-4,5 x 1,7-2,5 mm, lanceoladas a ovadas ou deltoides, não prolongadas abaixo do ponto de inserção; pecíolo 1,5 -7 cm compr. **Folíolos** basais 3-8,5 x 1,5-6 cm, não lobados, assimétricos, ovados ou deltóides, ápice arredondado, obtuso a agudo, base truncada a obtusa, terminal 3-10,3 x 2,3-8 cm, não lobado, simétrico, ovado, trulado ou deltoide, ápice obtuso a agudo, base truncada a obtusa, face adaxial glabrescente a velutina, abaxial pubérula a velutina. Inflorescência 3,2-13,3 cm compr., glabrescente a pubescente. **Flores** com cálice campanulado, 4-laciniado, tubo 2,5-5 mm compr., glabro a glabrescente externamente; corola branca com uma mancha roxa nas alas; estandarte 16,5-21 x 17,7-25 mm, assimétrico, ápice emarginado, 1 par de apêndices basais; asas 21,4-26,3 x 10-12,5 mm, arredondada a orbicular, esporão obtuso; pétalas da quilha 27-47,5 x 5-9,5 mm, cocleadas, 2 voltas; estames 42-56 mm compr.; ovário 8-12,5 x 1-1,3 mm, pubérulo a pubescente; estilete 34,5-42 mm compr., não prolongado além do ponto de inserção do estigma; estigma terminal. **Legumes** 7-8 x 0,7-1 cm, glabros. **Sementes** 9-13, 6-7 x 4,8-5,3, borda superior côncava e inferior convexa, castanhas ou negras.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Cerrado (lato sensu)

Distribuição GeográficaOcorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará, Tocantins)

Nordeste (Bahia)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Pedrali, 2653, BHCB, CEN, Minas Gerais

P.E. Gibbs, 3516, UEC, São Paulo

P.E. Gibbs, 4292, UEC,  (UEC070949), São Paulo

M. Sazima, 21001, UEC, São Paulo