

Microlobius C.Presl

Marli Pires Morim

Jardim Botânico do Rio de Janeiro; mpires@jbrj.gov.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Microlobius*, *Microlobius foetidus*.

COMO CITAR

Morim, M.P. 2020. *Microlobius* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB111811>.

Tem como sinônimo

homotípico *Goldmania* Rose ex Micheli

DESCRIÇÃO

Arbustos a arvoretas. Nectário extrafloral séssil, peciolar. Folhas bipinadas; raque não alada. Inflorescências racemos espiciformes, solitários ou aos pares. Flores pentâmeras, sésseis, homomórficas; androceu com dez estames, filetes livres, anteras com glândulas; gineceu pubérulo. Fruto folículo; semente obovoide, pálido acinzentada, pleurograma mediano.

Forma de Vida

Arbusto, Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Pantanal

Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

BIBLIOGRAFIA

Sousa, M. & Andrade, G. 1992. Anales Inst. Biol. Univ.Nac. Autón. México Ser. Bot. 63 (1): 101-107.1992.

Microlobius foetidus (Jacq.) M.Sousa & G.Andrade

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Microlobius foetidus*, *Microlobius foetidus subsp. paraguensis*.

DESCRIÇÃO

Arbustos a arvoretas; ramos glabros, inermes. Estipulas caducas. Nectário séssil, peciolar. Folhas bipinadas. Inflorescências espiciformes, solitárias ou aos pares. Flores pentâmeras, sésseis, homomórficas; cálice pubescente; corola gamopétala, pubescente; androceu com dez estames, filetes livres, anteras com glândulas caducas; gineceu pubérulo. Fruto fóliculo, oblongo, subfalcado, coriáceo com epicarpo com tricomas pulverulentos; semente obovoide, pálido acinzentada, pleurograma mediano.

Forma de Vida

Arbusto, Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Pantanal

Tipos de Vegetação


Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Claúdio de A. Conceição, 1453, RB, 256103,  (RB00180792)

C. de Almeida, 1030, RB, 260632,  (RB00181545), Mato Grosso do Sul

Microlobius foetidus subsp. *paraguensis* (Benth.) M. Sousa & G. Andrade

Tem como sinônimo

basiônimo *Pithecolobium paraguense* Benth.

homotípico *Goldmania paraguariensis* (Benth.) Brenan

homotípico *Piptadenia paraguensis* (Benth.) Lindman

DESCRIÇÃO

Folhas bipinadas, com um par de pinas, opostas, com um a dois pares de foliólulos por pina; foliólulos opostos, sésseis, glabros, ovados a obovados.

Forma de Vida

Arbusto, Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Pantanal

Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. de A. Conceição, 559, RB, 205745,   (RB00181574), Mato Grosso do Sul

C.B.Silva, 04, RB, 490642,  (RB00578204), Mato Grosso do Sul