

# *Parodiolyra* Soderstr. & Zuloaga

Iasmin Laiane de Castro Oliveira

Universidade Estadual de Feira de Santana; iasminlaiane@gmail.com

Reyjane Patrícia Oliveira

Universidade Estadual de Feira de Santana; rpatricia@uefs.br

Maria Luiza Silveira de Carvalho

Universidade Federal da Bahia; silveiradecarvalho@gmail.com

---

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Parodiolyra*, *Parodiolyra lateralis*, *Parodiolyra luetzelburgii*, *Parodiolyra ramosissima*.

## COMO CITAR

Oliveira, I.L.C., Oliveira, R.P., Carvalho, M.L.S. 2020. *Parodiolyra* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB13423>.

## DESCRIÇÃO

*O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>).*

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Campinarana, Cerrado (lato sensu), Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)

Nordeste (Bahia, Maranhão)

Centro-Oeste (Mato Grosso)

### Possíveis ocorrências

Nordeste (Sergipe)

## CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1'. Lâminas foliares 2.5-5 cm compr.; espiguetas femininas escuras na maturidade, endurecidas, 2-2.6 mm compr.; antécio glabro, ápice

obtusos..... *P. lateralis*

1". Lâminas foliares 4-13 cm compr.; espiguetas femininas claras na maturidade, cartáceas, 3-4.6 mm compr.; antécio com ápice piloso, acuminado.

2". Lâminas foliares com margens inferiores glabras ou escabras; espiguetas femininas 5-5.8 x 1.9-2.8 mm, as masculinas 3.5-4.3 mm compr.... *P. ramosissima*

2". Lâminas foliares com margens inferiores das longo ciliadas; espiguetas femininas 3-3.6 x 1.5-1.7 mm, as masculinas 4.1-5 mm compr..... *P. luetzelburgii*

## BIBLIOGRAFIA

- Judziewicz, E.J.L.; Clark, L.G.; Londoño, X. & Stern, M.J. 1999. *American Bamboos*. Smithsonian Institution Press, Washington, D.C. 392p.
- Soderstrom, T.R. & Zuloaga, F.O. 1989. A revision of the genus *Olyra* and the new segregate genus *Parodiolyra* (Poaceae: Bambusoideae: Olyreae). *Smithsonian Contributions to Botany* 69:1-79.
- Zuloaga, F.O. & Davidse, G. 1999. A New Species and a New Combination in the Genus *Parodiolyra* (Poaceae: Bambusoideae: Olyreae). *Novon* 9(4): 587-591.

# *Parodiolyra lateralis* (J.Presl ex Nees) Soderstr. & Zuloaga

## Tem como sinônimo

basônimo *Panicum laterale* J. Presl ex Nees

homotípico *Olyra lateralis* (J. Presl ex Nees) Chase

heterotípico *Olyra sarmentosa* Döll

heterotípico *Raddiella truncata* Swallen

## DESCRIÇÃO

**Folha:** lâmina(s) foliar(es) 2.5 - 5 compr. (cm); **margem(ns) inferior(es) da lâmina(s) foliar(es)** longo(s) ciliada(s). **Flor:** **indumento do antécio(s) feminino(s)** glabro(s); **antécio(s) feminino(s)** ápice(s) obtuso(s); **espiguetas femininas(s) compr. (mm)** 2 - 2.6 mm; **espiguetas femininas(s) larg. (mm)** até 1.2 mm; **espiguetas masculinas(s) compr. (mm)** 3 - 4 mm; **cor das espiguetas femininas(s) na(s) maturidade** escura.

## DESCRIÇÃO ADICIONAL

*O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>).*

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Tipos de Vegetação

Campinarana, Floresta de Terra Firme

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará, Roraima)

## MATERIAL TESTEMUNHO

E. Poeppig, 3055, G, G00099763,  (G00099763), **Typus**

G.T. Prance, 16125, US

## IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Parodiolyra lateralis* (J.Presl ex Nees) Soderstr. & Zuloaga

## BIBLIOGRAFIA

Soderstrom, T.R. & Zuloaga, F.O. 1989. A Revision of the Genus *Olyra* and the New Segregate Genus *Parodiolyra* (Poaceae: Bambusoideae: Olyreae). *Smithsonian Contributions to Botany* 69: 1-79.

# *Parodiolyra luetzelburgii* (Pilg.) Soderstr. & Zuloaga

## Tem como sinônimo

basiônimo *Olyra luetzelburgii* Pilg.

## DESCRIÇÃO

**Folha:** lâmina(s) foliar(es) 4 - 13 compr. (cm); **margem(ns) inferior(es) da lâmina(s) foliar(es)** longo(s) ciliada(s). **Flor:** **indumento do antécio(s) feminino(s)** tricoma(s) no ápice(s); **antécio(s) feminino(s)** ápice(s) acuminado(s); **espiguetas(s) feminina(s) compr. (mm)** 3 - 3.6 mm; **espiguetas(s) feminina(s) larg. (mm)** 1.5 - 1.7 mm; **espiguetas(s) masculina(s) compr. (mm)** 4.1 - 5 mm; **cor das espiguetas(s) feminina(s) na(s) maturidade** cor clara.

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Tipos de Vegetação

Cerrado (lato sensu), Floresta de Terra Firme

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)

Nordeste (Maranhão)

Centro-Oeste (Mato Grosso)

## MATERIAL TESTEMUNHO

P. Luetzelburg, 21354, IAN, R, US, **Typus**

I.L. Amaral, 815, RB, 373956,  (RB00651630), NY, 864917,  (NY00864917)

## IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Parodiolyra luetzelburgii* (Pilg.) Soderstr. & Zuloaga

## BIBLIOGRAFIA

Soderstrom, T.R. & Zuloaga, F.O. 1989. A revision of the genus *Olyra* and the new segregate genus *Parodiolyra* (Poaceae: Bambusoideae: Olyreae). *Smithsonian Contributions to Botany* 69:1-79.

# *Parodiolyra ramosissima* (Trin.) Soderstr. & Zuloaga

## Tem como sinônimo

basiônimo *Olyra ramosissima* Trin.

heterotípico *Olyra blanchetii* Mez

## DESCRIÇÃO

**Folha:** lâmina(s) foliar(es) 4 - 13 compr. (cm); **margem(ns) inferior(es) da lâmina(s) foliar(es)** glabra(s) ou escabra(s).

**Flor:** indumento do antécio(s) feminino(s) tricoma(s) no ápice(s); **antécio(s) feminino(s)** ápice(s) acuminado(s); **espigeta(s) feminina(s) compr. (mm)** 5 - 5.8 mm; **espigeta(s) feminina(s) larg. (mm)** 1.9 - 2.8 mm; **espigeta(s) masculina(s) compr. (mm)** 3.5 - 4.3 mm; **cor das espigeta(s) feminina(s) na(s) maturidade** cor clara.

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia)

### Possíveis ocorrências

Nordeste (Sergipe)

## MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 161, US, G, G00099754,  (G00099754), **Typus**

R.P. Oliveira, 688, UEC, 130962,  (UEC088703), Bahia

F.M. Ferreira, 1786, RB, 546981,  (RB00709467)

L.A. Mattos-Silva, 898, RB, 220995,  (RB00623265)

M.M. Silva, 369, RB, 391169,  (RB00623274)

## IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Parodiolyra ramosissima* (Trin.) Soderstr. & Zuloaga



Figura 2: *Parodiolyra ramosissima* (Trin.) Soderstr. & Zuloaga

## BIBLIOGRAFIA

Soderstrom, T.R. & Zuloaga, F.O. 1989. A revision of the genus *Olyra* and the new segregate genus *Parodiolyra* (Poaceae: Bambusoideae: Olyreae). *Smithsonian Contributions to Botany* 69: 1-79.