

Plagiantha Renvoize

Andreza Oliveira Matos

Universidade Estadual de Feira de Santana; aandreza.oliveiram@gmail.com

Reyjane Patrícia Oliveira

Universidade Estadual de Feira de Santana; rpatricia@uefs.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Plagiantha*, *Plagiantha tenella*.

COMO CITAR

Matos, A.O., Oliveira, R.P. 2020. *Plagiantha* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB13533>.

DESCRIÇÃO

Anuais ou perenes. Lâminas foliares basais e caulínicas. Panículas moderadamente ramificadas. Espiguetas pequenas e fundida ao pedicelo obliquamente, oblongas e gibosas. Lema inferior membranosa, 2-nervada. Pálea inferior herbácea.

COMENTÁRIO

Gênero monotípico, restrito a Bahia. Presente nos campos rupestres da Chapada Diamantina.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação

Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia)

BIBLIOGRAFIA

Renvoize, S.A. 1982. A new genus and several new species of grasses from Bahia (Brazil). *Kew Bulletin* 37(2): 323-333.
Renvoize, S.A. 1984. The grasses of Bahia. Kew: Royal Botanic Gardens.

Plagiantha tenella Renvoize

DESCRIÇÃO

Anual ou perene. Colmos 30-80 cm, delgados, eretos ou geniculados, ascendentes, ramificando na base e algumas vezes enraizado nos nós inferiores. Lâminas foliares lanceoladas, 5-10 cm x 3-7 mm, mais fina na base, glabra, escaberula, aguda. Panícula ovada, 5-8 cm compr., moderadamente ramificada com ramos abertos. Espiguetas 2.2-2.8 mm compr, glabra. Gluma inferior ovada, 1/4 do comprimento da espiguetas, 3(-5)-nervada; gluma superior ovada, pouco menor que a espiguetas, 5-nervada; lema inferior oblongo, biquilhado, com ponta hialina; pálea inferior bem desenvolvida, flor inferior ausente. Antécio superior papilado, claro e apiculado.

Forma de Vida

Ervã

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação

Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 16639, K,  (K000003964), Bahia, **Typus**
Oliveira, R.P., 179, HUEFS (HUEFS0036387), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Plagiantha tenella* Renvoize

BIBLIOGRAFIA

- Renvoize, S.A. 1982. A new genus and several new species of grasses from Bahia (Brazil). *Kew Bulletin* 37(2): 323-333.
- Renvoize, S.A. 1984. The grasses of Bahia. Kew: Royal Botanic Gardens.