

Quekettia Lindl.

Thiago Faria dos Santos

Universidade Estadual de Campinas; thiaguerafaria@gmail.com

Eric de Camargo Smidt

Universidade Federal do Paraná; ecsmidt@gmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Quekettia*, *Quekettia microscopica*.

COMO CITAR

Santos, T.F., Smidt, E.C. 2020. *Quekettia* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB20177>.

Tem como sinônimo

heterotípico *Stictophyllorchis* Dodson & Carnevali

heterotípico *Stictophyllum* Dodson & M.W.Chase

DESCRIÇÃO

Planta epífita. Pseudobulbo oblongo. Folhas cilíndricas, eretas, crásseas, margem inteira, ápice agudo. Inflorescência 1- muitas flores; brácteas florais inconspícuas. Flores amarelo-claras. Sépala dorsal oblonga a obovada, margem inteira, ápice agudo a obtuso. Sépala laterais oblongas a obovadas, conadas até a metade, margem inteira, ápice agudo a obtuso. Pétalas semelhantes às sépala, livres, margem inteira, ápice agudo a obtuso. Labelo obovado, margem inteira; ápice triangular e flexionado para baixo, agudo. Coluna com asas laterais falciformes.

COMENTÁRIO

Quekettia (Epidendroideae, Cymbidieae, Oncidiinae (Chase et al. 2015)) trata-se de gênero Neotropical e Amazônico, com cerca de 7 espécies distribuídas no Brasil, Equador, Guianas, Suriname, Trindade e Venezuela (Pridgeon et al. 2009).

Forma de Vida

Erva

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Campinarana, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará, Roraima)

Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

Possíveis ocorrências

Nordeste (Alagoas)

BIBLIOGRAFIA

Chase, M. W., Cameron, K. M., Freudenstein, J. V., Pridgeon, A. M., Salazar, G., Berg, C., & Schuiteman, A. 2015. An updated classification of Orchidaceae. *Botanical journal of the Linnean Society*, 177(2), 151-174.

Garay, L. A. 1954. *Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro*, 13, 47.

Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.W. & Rasmussen, F.N. 2009. *Genera Orchidacearum: Epidendroideae (Part 1)*. Oxford University Press, Oxford, 4, 336-337.

Quekettia microscopica Lindl.

Tem como sinônimo

heterotípico *Quekettia chrysantha* Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Planta epífita. Pseudobulbo oblongo. Folhas cilíndricas, eretas, crásseas, margem inteira, ápice agudo. Inflorescência 1- muitas flores; brácteas florais inconspícuas. Flores amarelo-claras. Sépala dorsal oblonga a obovada, margem inteira, ápice agudo a obtuso. Sépala laterais oblongas a obovadas, conadas até a metade, margem inteira, ápice agudo a obtuso. Pétalas semelhantes às sépala, livres, margem inteira, ápice agudo a obtuso. Labelo obovado, margem inteira; ápice triangular e flexionado para baixo, agudo. Coluna com asas laterais falciformes.

COMENTÁRIO

Quekettia microscópica descrita por Lindley, J. (1839), trata-se da espécie tipo do gênero, que homenageia o botânico Edwin J. Quekett.

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Campinarana, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará, Roraima)

Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)


Possíveis ocorrências


Nordeste (Alagoas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Oliveira, E, 1646, IAN (IAN111488), Goiás

Lewis, G.P., 1526, K (K000886413), Roraima

Ferreira, CAC, 6449, INPA, 138084,  (INPA0138084), Mato Grosso

J. Barbosa-Rodrigues, s.n., SOF,  (SOF300585), Amazonas

Pires, JM, 659, IAN (IAN017642), Pará

BIBLIOGRAFIA

Lindley, J. 1839. Edwards's Botanical Register, 25. 3-4.