

Ruppiaceae Horan.

Tamara de Andrade Ferreira Vieira

Universidade Federal do Rio de Janeiro - Museu Nacional; tamara.afvieira@gmail.com

Claudia Petean Bove

Universidade Federal do Rio de Janeiro - Museu Nacional; cpbove@hotmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Ruppiaceae, *Ruppia*.

COMO CITAR

Vieira, T.A.F., Bove, C.P. 2020. Ruppiaceae in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB211>.

DESCRIÇÃO

Erva perene ou anual, submersa fixa, monoica, glabra. **Caule** rizomatoso. **Folhas** alternas a subopostas, lineares, invaginantes, verdes, uninérveas. **Inflorescência** em espiga, 2-4 flores, terminal ou axilares, envolvida por duas bainhas foliares. **Flores** bissexuadas, actinomorfas, aclamídeas; estames 2, subsésseis, anteras ditecas, rimosas; gineceu apocárpico, cíclico, carpelos (-2)3-4(-16), ovário súpero, placentação pêndula, estigma terminal, séssil. **Fruto** drupa, piriforme.

Forma de Vida

Ervácea

Substrato

Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Restinga, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí)

Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

Ruppia L.

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Ruppia*, *Ruppia maritima*.

COMO CITAR

Vieira, T.A.F., Bove, C.P. Ruppiaceae in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB14340>.

Tem como sinônimo

heterotípico *Bucafer* Adans.

heterotípico *Buccaferrea* P.Micheli ex Petagna

heterotípico *Dzieduszyckia* Rehmann

DESCRIÇÃO

Erva perene ou anual, submersa, glabra. **Caule** ramificado. **Folhas** alternas a subopostas bainha aberta, ápice truncado a arredondado; limbo 38-140mm compr., ápice agudo levemente serreado. **Inflorescência** simples, axilar ou terminal. **Flores** hermafroditas, sésseis, anteras 2, carpelos 3-5. **Fruto** séssil, estipitado, linear ou retorcido, negro ou bege.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Restinga, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí)

Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

BIBLIOGRAFIA

Hartog, C. & Kuo, J. 2006. Taxonomy and biogeography of seagrasses. In: Larkum,A.W.D.;Orth, R.J. & Duarte, C.M. Seagrasses: Biology, Ecology and Conservation. The Netherlands : Springer. pp.1-23.

Ruppia maritima L.

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Ruppia maritima*, .

Tem como sinônimo

- heterotípico *Buccaferra maritima* (L.) Lunell
- heterotípico *Ruppia andina* Phil.
- heterotípico *Ruppia aragonensis* Loscos
- heterotípico *Ruppia brachypus* J.Gay
- heterotípico *Ruppia brevipes* Bertol. ex Griseb.
- heterotípico *Ruppia cirrhosa* subsp. *longipes* (Hagstr.) Á.Löve
- heterotípico *Ruppia curvicarpa* A.Nelson
- heterotípico *Ruppia drepanensis* Tineo
- heterotípico *Ruppia intermedia* C.G.H.Thed.
- heterotípico *Ruppia maritima* subsp. *brachypus* (J.Gay) Schlegel
- heterotípico *Ruppia maritima* subsp. *brevirostris* C.Agardh
- heterotípico *Ruppia maritima* subsp. *drepanensis* (Tineo) Maire & Weiller
- heterotípico *Ruppia maritima* subsp. *intermedia* (C.G.H.Thed.) Piper & Beattie
- heterotípico *Ruppia maritima* subsp. *rostellata* (W.D.J.Koch ex Rchb.) Asch. & Graebn.
- heterotípico *Ruppia maritima* subsp. *rostrata* (C.Agardh) Piper & Beattie
- heterotípico *Ruppia maritima* var. *brachypus* (J.Gay) K.Schum.
- heterotípico *Ruppia maritima* var. *brevirostris* (C.Agardh) Asch. & Graebn.
- heterotípico *Ruppia maritima* var. *curvicarpa* (A.Nelson) Fernald & Wiegand
- heterotípico *Ruppia maritima* var. *drepanensis* (Tineo) K.Schum.
- heterotípico *Ruppia maritima* var. *exigua* Fernald & Wiegand
- heterotípico *Ruppia maritima* var. *floridana* Graebn.
- heterotípico *Ruppia maritima* var. *intermedia* (C.G.H.Thed.) Asch. & Graebn.
- heterotípico *Ruppia maritima* var. *japonica* H.Hara
- heterotípico *Ruppia maritima* var. *longipes* Hagstr.
- heterotípico *Ruppia maritima* var. *minor* Mert. & W.D.J.Koch
- heterotípico *Ruppia maritima* var. *obliqua* (Griseb. & Schenk) Asch. & Graebn.
- heterotípico *Ruppia maritima* var. *onondagensis* Fernald & Wiegand
- heterotípico *Ruppia maritima* var. *pacifica* H.St.John & Fosberg
- heterotípico *Ruppia maritima* var. *recta* Moris
- heterotípico *Ruppia maritima* var. *rostrata* C.Agardh
- heterotípico *Ruppia maritima* var. *subcapitata* Fernald & Wiegand
- heterotípico *Ruppia obliqua* Griseb. & Schenk
- heterotípico *Ruppia pectinata* Rydb.
- heterotípico *Ruppia rostellata* subsp. *aragonensis* (Loscos & J.Pardo) K.Richt.
- heterotípico *Ruppia rostellata* var. *aragonensis* (Loscos & J.Pardo) Nyman
- heterotípico *Ruppia rostellata* var. *brachypus* (J.Gay) T.Marsson
- heterotípico *Ruppia rostellata* W.D.J.Koch ex Rchb.
- heterotípico *Ruppia salina* Schur
- heterotípico *Ruppia spiralis* subsp. *longipes* (Hagstr.) Á.Löve & D.Löve
- heterotípico *Ruppia spiralis* subsp. *transsilvanica* (Schur) Nyman
- heterotípico *Ruppia subsessilis* Thwaites
- heterotípico *Ruppia taquetii* H.Lév.
- heterotípico *Ruppia transsilvanica* Schur
- heterotípico *Ruppia trichodes* Durand
- heterotípico *Ruppia zosteroides* Lojac.
- heterotípico *Zannichellia pedunculata* Fuss

DESCRIÇÃO

Erva perene ou anual, máculas vináceas presentes ou ausentes. **Caule** com intrenós 19-58 cm compr. **Folhas** alternas a subopostas bainha 9-19mm compr., aberta, ápice truncado a arredondado; limbo 38-140mm compr., ápice agudo levemente serreado. **Inflorescência** 4,8-37mm, pedúnculo 1,8-27 mm compr. **Flores** sésseis, anteras subelipsóides, carpelos 3-5. **Fruto** 2,3-4

x 1-3mm, estípite 5-40mm compr., pedúnculo 8-91mm compr., linear ou retorcido, negro ou bege, com um prolongamento apical achatado ou agudo.

COMENTÁRIO

Comentários: Carpelos sésseis, mas depois de fecundadas há o crescimento de uma estípite; material seco pode apresentar máculas vináceas em toda a planta.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Restinga, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí)

Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.P. Bove, 1763, R, 215996, Rio de Janeiro

Gomes, J.M.L., 1002, R, 222578, Espírito Santo

Pereira, O.J., 1951, R, 222579, Espírito Santo

BIBLIOGRAFIA

Hartog, C. & Kuo, J. 2006. Taxonomy and biogeography of seagrasses. In: Larkum,A.W.D.;Orth, R.J. & Duarte, C.M. Sesgrasses: Biology, Ecology and Conservation. The Netherlands : Springer. pp.1-23.