

Skytanthus hancorniifolius (A.DC.) Miers

Tem como sinônimo

basiônimo *Neriandra hancorniifolia* A.DC.

homotípico *Skytanthus hancorniaefolius* (A.DC.) Miers

heterotípico *Skytanthus martianus* (Müll.Arg.) Miers

DESCRIÇÃO

S. hancorniifolius (A.DC.) Miers e *S. martianus* (Müll.Arg.) Miers possuem distribuição e características que se sobrepõem, assim nessa obra estamos considerando *S. martianus* como sinônimo de *S. hancorniifolius*.

S. hancorniifolius possui ramos glabros, látex branco. Folhas geralmente opostas, podendo ser alternas no ápice dos ramos, com venação eucamptódroma e mais de 30 nervuras paralelas entre si. Inflorescências terminais e cimosas.

Corola hipocrateriforme, amarela, lobos da corola 2x maiores do que o tubo, sendo o tubo inferior cilíndrico e o superior inflado. Folículos em espiral com cerca de 30 cm de comprimento. Sementes com duas alas laterais.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Caatinga (stricto sensu), Restinga


Distribuição Geográfica




Ocorrências confirmadas


Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.P. Queiroz, 2925, ESA, 80380,  (ESA080380), Bahia

A.F.M. Glaziou, 12946, K,  (K000965530), K,  (K000965477), G, G00169804,  (G00169804), Rio de Janeiro

A. Blanchet, 3644, K,  (K000587755), MO (MO100327), **Typus**

BIBLIOGRAFIA