

Steirachne Ekman

Antônio Elielson Sousa da Rocha

Museu Paraense Emilio Goeldi; asrocha@museu-goeldi.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Steirachne*, *Steirachne barbata*, *Steirachne diandra*.

COMO CITAR

Rocha, A.E.S. 2020. *Steirachne* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB20498>.

DESCRIÇÃO

Erva perene, cespitosa, lígula uma membrana ciliada, lâmina foliar filiforme; glabra, pilosa na base adaxial com tricomas de base tuberculada. Inflorescência uma panícula laxa a semi contraída, inflorescência cleistogâmica presente nas bainhas superiores. Espiguetas solitárias, pediceladas, 2-10 antécios, oblongos; lateralmente comprimidos; desarticulando acima das glumas e entre os antécios; raquias com tufo de tricomas no ápice, glumas persistentes acuminadas, desiguais, mais curtas que o antécio, membranáceas; quilhadas; 1-nervadas, antécios divergentes; livres no ápice; os terminais maiores que os basais, lema fértil ovado; membranoso; 3-nervado, nervuras laterais proeminentes, ápice atenuado, pálea com quilhas aladas e ciliadas.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo de Várzea, Campo Limpo, Campo Rupestre, Carrasco, Restinga, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Pará, Roraima)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte)

Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Erva 10-40 cm altura, inflorescência 2-3 cm compr., semi contraída, ráquila pouco visível, gluma inferior 1-1,2 mm compr., gluma superior 1,5-2 mm compr., lema 2,5-3,5 mm compr.....*Steirachne diandra*

1. Erva 40-70 cm altura, inflorescência 3-8 cm compr., laxa, ráquila visível, gluma inferior 1,5-2 mm compr., gluma superior 2-2,5 mm compr., lema 3,5-5 mm compr.....*Steirachne barbata*

Steirachne barbata (Trin.) Renvoize

Tem como sinônimo

basônimo *Eragrostis barbata* Trin.

DESCRIÇÃO

Caule: alt. da planta(s) 40 - 70 cm alt.. **Folha:** tamanho da lâmina(s) foliar(es) 3 - 17 cm compr.. **Inflorescência:** tipo de inflorescência(s) panícula(s) laxa(s); tamanho da inflorescência(s) 3 - 8 cm compr.; **ráquila** vistosa(s). **Flor:** tamanho da gluma(s) inferior(es) 1.5 - 2 mm compr.; tamanho da gluma(s) superior(es) 2 - 2.5 mm compr.; **número de antécio(s)** 6 - 10; **tamanho do lema(s) fértil(eis)** 3.5 - 5 mm compr..

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo de Várzea, Campo Limpo, Campo Rupestre, Carrasco, Restinga

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Pará)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte)

Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, s.n., US, K,  (K000308841), **Typus**


M.R.A. Mendes et al., 319, UB, TEPB, 28172, Piauí

F.S. Araújo & L.C. Girão, 1499, HUEFS, 67538, EAC, 33929, Ceará

J.F.M. Valls, 15597, CEN, Bahia

H.M. Longhi-Wagner, 4140, ICN, 126713, Minas Gerais

R.C. Oliveira et al., 2254, MAC, 38935, EAC, 45112, UFRN, 9768, MOSS, 10529, Rio Grande do Norte

D. Daly, 316, INPA, 116389, MO, 1821748, NY, 896431,  (NY00896431), Maranhão

R.M. Harley, 17300, K (K000003170), Bahia

Steirachne diandra Ekman

DESCRIÇÃO

Caule: alt. da planta(s) 10 - 40 cm alt.. **Folha:** tamanho da lâmina(s) foliar(es) 2 - 8 cm compr.. **Inflorescência:** tipo de inflorescência(s) panícula(s) semi contraída(s); tamanho da inflorescência(s) 2 - 3 cm compr.; **ráquila** pouco vistosa(s). **Flor:** tamanho da gluma(s) inferior(es) 1 - 1.2 mm compr.; tamanho da gluma(s) superior(es) 1.5 - 2 mm compr.; número de antécio(s) 2 - 8; tamanho do lema(s) fértil(eis) 2.5 - 3.5 mm compr..

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo de Várzea, Restinga, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas


Norte (Pará, Roraima)

Nordeste (Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte)

MATERIAL TESTEMUNHO


A. Löfgren, 488, S, Ceará, **Typus**

J.F.M. Valls, 15786, CEN, Piauí

G.A. Black, 51-13994, INPA, 4615,  (INPA0004615), Roraima

C.G.T. Ferreira et al., 286, EAC, 45271, UFRN, 9744, UFP, 55095, HUEFS, 145336, MOSS, 9072, Rio Grande do Norte

L. Coradin, 827, INPA, 97552,  (INPA0097552), CEN, 3053, Roraima

L. Coradin, 834, INPA, 97557,  (INPA0097557), CEN, 3059, Roraima