

# *Stenia* Lindl.

Thiago Erir Cadete Meneguzzo

Jardim Botânico do Rio de Janeiro; botanica@meneguzzo.net.br

Climbiê Ferreira Hall

Museu Paraense Emílio Goeldi; climbiehall@yahoo.com.br

---

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Stenia*, *Stenia bohnkiana*, *Stenia pallida*.

## COMO CITAR

Meneguzzo, T.E.C., Hall, C.F. 2020. *Stenia* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB12317>.

### Tem como sinônimo

homotípico *Stenopolen* Raf.

heterotípico *Dodsonia* Ackerman

## DESCRIÇÃO

Ervas epífitas, rizoma inconspícuo. Pseudodulbo inconspícuo. Flores com labelo fortemente sacado, lobos laterais convolutos ou involutos.

### **Forma de Vida**

Ervá

### **Substrato**

Epífita

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

### **Domínios Fitogeográficos**

Amazônia, Mata Atlântica

### **Tipos de Vegetação**

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

### **Distribuição Geográfica**

#### Ocorrências confirmadas

Norte (Roraima)

Nordeste (Bahia)

#### Possíveis ocorrências

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)

Centro-Oeste (Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

## CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Flores com sépalas e pétalas com ápice agudo; labelo com porção proximal angular, margem lateral revoluta, margens distais sobrepostas ... *S. bohnkiana*

1'. Flores com sépalas e pétalas com ápice arredondado; labelo com porção proximal arredondada, margem lateral involuta, margens distais não sobrepostas ... *S. pallida*

# *Stenia bohnkiana* V.P.Castro & G.F.Carr

## DESCRIÇÃO

**Flor:** sépala(s) e pétala(s) ápice(s) acuminada(s); **labelo porção proximal(ais)** angular; **labelo margem(ns) lateral(ais)** involuta(s); **labelo margem(ns) distal(ais)** sobreposta(s); **coluna(s) asa(s) estigmática(s)** conspicua(s).

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Epífita

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica




### Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia)

### Possíveis ocorrências

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

## MATERIAL TESTEMUNHO

Reginato, M., 230, CEPEC,  (CEPEC00106716), Bahia  
A.M. Amorim, 5046, CEPEC,  (CEPEC00109331), Bahia  
Bohnke, E., s.n., SP, 376983,  (SP002427), Bahia, **Typus**

# *Stenia pallida* Lindl.

## DESCRIÇÃO

**Flor:** sépala(s) e pétala(s) ápice(s) arredondado(s); **labelo porção proximal(ais)** arredondada(s); **labelo margem(ns) lateral(ais)** revoluta(s); **labelo margem(ns) distal(ais)** não sobreposta(s); **coluna(s) asa(s) estigmática(s)** inconspícua(s).

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Epífita

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Roraima)

### Possíveis ocorrências

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)

Centro-Oeste (Mato Grosso)

## MATERIAL TESTEMUNHO

Silva, J.B.F., 161, MG, Roraima