

Stephostachys Morrone & Zuloaga

André Rodolfo de Oliveira Ribeiro

Universidade Federal do Ceará; andre_rodolf@hotmail.com

Anádrria Stéphanie da Silva

Universidade de Brasília; anadriastephanies@hotmail.com

Regina Célia de Oliveira

Universidade de Brasília; regina711@hotmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Stephostachys*, *Stephostachys mertensii*.

COMO CITAR

André R.O. Ribeiro, Anádrria S. Silva, Oliveira, R.C. 2020. *Stephostachys* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB123656>.

DESCRIÇÃO

Ervas perenes cespitosas. **Inflorescência** paniculiforme, com ramos de segunda ordem verticilados. **Espiguetas** com achatamento dorsal. **Glumas** presentes, a **gluma inferior** menor que a **gluma superior**. **Antécios** 2, o **inferior** estéril, o **superior** fértil e de consistência mais rígida. **Antécio superior** com superfície aproximadamente lisa, com papilas e estômatos no ápice. **Cariopse** com hilo punctiforme.

Forma de Vida

Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação

Campo de Várzea, Cerrado (lato sensu), Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Pará, Roraima)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Santa Catarina)

BIBLIOGRAFIA

Zuloaga, F.O.; Scataglino, M.A. & Morrone, O. 2010. A phylogenetic evaluation of sects. *Agrostoidea*, *Megista*, *Prionitia* and *Tenera* of *Panicum* (Panicoideae, Poaceae): two new genera *Stephostachys* and *Sorengia*. *Taxon* 59: 1535-1546.

Stephostachys mertensii (Roth) Zuloaga & Morrone

Tem como sinônimo

basiônimo *Panicum mertensii* Roth

DESCRIÇÃO

Ervas perenes cespitosas. **Inflorescência** paniculiforme, com ramos de segunda ordem verticilados. **Espiguetas** com achatamento dorsal. **Glumas** presentes, a **gluma inferior** menor que a **gluma superior**. **Antécios** 2, o **inferior** estéril, o **superior** fértil e de consistência mais rígida. **Antécio superior** com superfície aproximadamente lisa, com papilas e estômatos no ápice.

Cariopse com hilo punctiforme.

Forma de Vida

Ervá

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação

Campo de Várzea, Cerrado (lato sensu), Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Pará, Roraima)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Santa Catarina)


MATERIAL TESTEMUNHO

M.A.S. Costa & J.R. Nascimento, 133, K (K000982345), INPA, 179894, Amazonas


G. Hatschbach, 15800, MO, 2483222, K (K000982351), MBM, 2035, Paraná

J.E. Paula, 792, UB, 10744, Maranhão

R.P. Lyra-lemos, 2684, RB, 477601,  (RB00552628), MAC, 8280, Alagoas

A. Chase, 7719, MO, 2959881, NY, 662275,  (NY00662275), Pernambuco

B.A. Krukoff, 5905, MO, 2959670, NY, 1166568,  (NY01166568), Pará

J.A. Ratter, 5912, MIRR, 2547, K (K000982347), NY, 1166569,  (NY01166569), Roraima

B.A. Krukoff, 5899, MO, 2959761, NY, 1166574,  (NY01166574), Pará

P.J.M. Maas, 12675, K (K000982346), Acre

G. Hatschbach, 36005, MBM, 32701, K (K000982348), NY, 864125, MO, 2960336, Mato Grosso do Sul

A.F.M. Glaziou, 9037, K (K000982357), Rio de Janeiro

Fróes, R.L., 26998, K (K000982353), Pará

J.R. Swallen, 3573, K (K000982361), Maranhão