

# *Steyermarkochloa* Davidse & R.P.Ellis

Kauê Nicolas Lindoso Dias

Museu Paraense Emílio Goeldi; knld.contato@gmail.com

Pedro Lage Viana

Museu Paraense Emilio Goeldi; pedroviana@museu-goeldi.br

---

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Steyermarkochloa*, *Steyermarkochloa angustifolia*.

## COMO CITAR

Dias, K.N.L., Viana, P.L. 2020. *Steyermarkochloa* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB87073>.

## DESCRIÇÃO

Plantas perenes. Colmos dimórficos; colmos vegetativos com apenas uma folha desenvolvida; bainhas cilíndricas. Sinflorescências espiciformes, cilíndricas, com espiguetas masculinas e bissexuadas dispostas na região inferior e femininas na região superior. Espiguetas 3-floras, geralmente unissexuadas, eventualmente bissexuadas, comprimidas dorsalmente; glumas 2; antécio inferior das espiguetas femininas estéril; lodículas ausentes; estigmas 2. Cariopse fusiforme.

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Tipos de Vegetação

Campo de Várzea, Savana Amazônica

## Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas)

# *Steyermarkochloa angustifolia* (Spreng.) Judz.

## Tem como sinônimo

heterotípico *Steyermarkochloa unifolia* Davidse & R.P.Ellis

## DESCRIÇÃO

Plantas perenes. Colmos dimórficos; colmos vegetativos com apenas uma folha desenvolvida; bainhas cilíndricas. Sinflorescências espiciformes, 7-49 cm compr., cilíndricas, com espiguetas masculinas e bissexuadas dispostas na região inferior e femininas na região superior. Espiguetas 3-floras, geralmente unissexuadas, eventualmente bissexuadas, comprimidas dorsalmente; espiguetas femininas 7-17 mm compr., gluma inferior 2-quilhada, 2,2-4,7 mm compr., 3-7-nervada, gluma superior 2,1-3,7 mm compr., 3-6-nervada; antécio inferior estéril; lodículas ausentes; estigmas 2; espiguetas masculinas e bissexuadas 4,5-7,5 mm compr., lodículas ausentes, estames 2. Cariopse fusiforme, 5 mm compr.

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Tipos de Vegetação

Campo de Várzea, Savana Amazônica

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas)

## BIBLIOGRAFIA

Ann. Missouri Bot. Gard. 77(1): 204 (1990); 77(1): 204 (