

Sudamerlycaste Archila

Thiago Erir Cadete Meneguzzo

Jardim Botânico do Rio de Janeiro; botanica@meneguzzo.net.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Sudamerlycaste*, *Sudamerlycaste andreettae*, *Sudamerlycaste fimbriata*, *Sudamerlycaste fragrans*, *Sudamerlycaste grandis*, *Sudamerlycaste lanipes*, *Sudamerlycaste linguella*, *Sudamerlycaste locusta*, *Sudamerlycaste nana*, *Sudamerlycaste reichenbachii*, *Sudamerlycaste rossyi*.

COMO CITAR

Meneguzzo, T.E.C. 2020. *Sudamerlycaste* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB70396>.

Tem como sinônimo

heterotípico *Ida* A.Ryan & Oakeley

DESCRIÇÃO

Ervas epífitas, rupícolas ou terrícolas, cespitosas. Pseudobulbos conspicuos, ovados e carinados. Folhas 1-2, terminais ao pseudobulbo, largo-elípticas e plicadas, bainhas subtendidas não foliadas a base do pseudobulbo. Inflorescência menor que altura da planta, axilar as bainhas do pseudobulbo, pauciflora. Flores com dialisépalas e dialipétalas. Pétalas não sobrepostas entre si e divergentes. Labelo fortemente trilobado, lobos laterais reduzidos e pouco inclinados ao disco, lobo mediano com margem não inteira, calo com quilhas internas.

COMENTÁRIO

Sudamerlycaste é um gênero sul-americano com cerca de 40 espécies. A validade nomenclatural do gênero já foi contestada algumas vezes por conta de dúvidas quanto a prioridade em relação a *Ida* A.Ryan & Oakeley, permanecendo, todavia, aceito. Difere de *Lycaste* especialmente pelo labelo com margem não inteira e lobos laterais reduzidos.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sudeste (Espírito Santo, São Paulo)

Possíveis ocorrências

Nordeste (Bahia)

Sudeste (Rio de Janeiro)

BIBLIOGRAFIA

Oakeley, H.F. (2008) *Ida, Lycaste and Anguloa*. Author's edition, Beckernham, 445 pp.

Sudamerlycaste andreettae (Dodson) Archila

Tem como sinônimo

basiônimo *Lycaste andreettae* Dodson

homotípico *Ida andreettae* (Dodson) Oakeley

Forma de Vida

Erva

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação

Área Antrópica

Sudamerlycaste fimbriata (Poepp. & Endl.) Archila

Tem como sinônimo

homotípico *Ida fimbriata* (Poepp. & Endl.) A.Ryan & Oakeley

homotípico *Lycaste fimbriata* (Poepp. & Endl.) Cogn.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação

Área Antrópica

Sudamerlycaste fragrans (Oakeley) Archila

Tem como sinônimo

basiônimo *Lycaste fragrans* Oakeley

heterotípico *Ida fragrans* (Oakeley) Oakeley

Forma de Vida

Erva

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação

Área Antrópica

Sudamerlycaste grandis Archila

Tem como sinônimo

homotípico *Ida grandis* Oakeley

homotípico *Lycaste grandis* Fowlie ex Oakeley

Forma de Vida

Erva

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação

Área Antrópica

Sudamerlycaste lanipes (Lindl.) Archila

Tem como sinônimo

basônimo *Lycaste lanipes* Lindl.

homotípico *Ida fimbriata* var. *lanipes* (Lindl.) Oakeley

Forma de Vida

Erva

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação

Área Antrópica

Sudamerlycaste linguella (Rchb.f.) Archila

Tem como sinônimo

basônimo *Lycaste linguella* Rchb.f.

homotípico *Ida linguella* (Rchb.f.) A.Ryan & Oakeley

Forma de Vida

Erva

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação

Área Antrópica

Sudamerlycaste locusta (Rchb.f.) Archila

Tem como sinônimo

basiônimo *Lycaste locusta* Rchb.f.

homotípico *Ida locusta* (Rchb.f.) A.Ryan & Oakeley

Forma de Vida

Erva

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação

Área Antrópica

Sudamerlycaste nana (Oakeley) Archila

Tem como sinônimo

basônimo *Lycaste nana* Oakeley

homotípico *Ida nana* (Oakeley) A.Ryan & Oakeley

Forma de Vida

Erva

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação

Área Antrópica

Sudamerlycaste reichenbachii (Gireoud ex Rchb.f.) Archila

Tem como sinônimo

basiônimo *Lycaste reichenbachii* Gireoud ex Rchb.f.

homotípico *Ida reichenbachii* (Gireoud ex Rchb.f.) A.Ryan & Oakeley

Forma de Vida

Erva

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação

Área Antrópica

Sudamerlycaste rossyi (Hoehne) Archila

Tem como sinônimo

basônimo *Lycaste rossyi* Hoehne

homotípico *Ida barringtoniae* subsp. *rossyi* (Hoehne) Oakeley

homotípico *Ida rossyi* (Hoehne) Campacci & Baptista

homotípico *Lycaste ciliata* subsp. *rossyi* (Hoehne) Fowlie

DESCRIÇÃO

Flores com sépalas e pétalas verdes e labelo branco.

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sudeste (Espírito Santo, São Paulo)

Possíveis ocorrências

Nordeste (Bahia)

Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Chiron, G.R., 12019, MBML (MBML049934), Espírito Santo