

Tabaroa L.P. Queiroz, G.P. Lewis & M.F. Wojc.

Luciano Paganucci de Queiroz

Universidade Estadual de Feira de Santana; luciano.paganucci@gmail.com

Domingos Benício Oliveira Silva Cardoso

Universidade Federal da Bahia; cardosobot@gmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Tabaroa*, *Tabaroa caatingicola*.

COMO CITAR

Queiroz, L.P., Cardoso, D.B.O.S. 2020. *Tabaroa* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB121880>.

DESCRIÇÃO

Árvores. **Estípulas** caducas, lineares. **Folhas** alternas, espiraladas, imparipinadas, folíolos opostos, não estipelados. **Inflorescência** panícula constituída de racemos com flores dispostas espiraladamente. **Flores** papilionadas, hipanto curto, cálice gamossépalo, bilabiado, lábio superior 3-lobado, o inferior 3-lobado; estandarte reflexo, alas livres da carena, pétalas da carena unidas entre si apenas na parte distal da margem inferior; androceu monadelfo, os 10 estames unidos em uma bainha aberta na margem vexilar; ovário sésil, estilete glabro distalmente. **Fruto** indeiscente, plano-compresso. **Semente** 1, compressa, testa lisa e macia.

COMENTÁRIO

Tabaroa é um gênero monoespecífico da Caatinga da Bahia. Morfologicamente assemelha-se a *Poecilanthe* de quem se diferencia pelos folíolos opostos (*vs.* folíolos alternos) e frutos indeiscentes (*vs.* frutos elasticamente deiscentes).

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Caatinga

Tipos de Vegetação

Caatinga (*stricto sensu*), Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia)

Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

BIBLIOGRAFIA

Queiroz, L.P., Lewis, G.P. & Wojciechowski, M.F. 2010. *Tabaroa*, a new genus of Leguminosae tribe Brongniartieae from Brazil. Kew Bulletin 65: 189-203.

Tabaroa caatingicola L.P. Queiroz, G.P. Lewis & M.F. Wojc.

DESCRIÇÃO

Árvore de pequeno porte, até 10 m alt.; tronco com casca reticulada, semelhante à pele de jacaré; indumento pubescente de tricomas curtos, fuscos, em ramos e folhas jovens, tornando-se esparsos ou glabros nessas partes adultas. **Estípulas** ca. $3 \times 0,5$ mm, lineares, caducas. **Folhas** com pecíolo 2,2–2,8 cm compr., raque 5,9–8,4 cm compr.; peciólulos 2–2,5 mm compr.; folíolos (5) 7–9 pares, 4,6–4,8 \times 2,1–2,2 cm, elípticos a oblongos, 1,5–2 \times mais longos do que largos, base truncada, arredondada a cordada, ápice obtuso ou arredondado, nervuras secundárias 10–12 pares, face adaxial glabra ou esparsamente pubérula, face abaxial pilosa. **Panícula** ca. 6,5 cm compr. e 6,5 cm larg., piramidal, quase pêndula, composta de 10–16 racemos; racemos individuais 2,3–3,8 cm compr.; brácteas ca. $1,5 \times 0,8$ mm, linear-lanceoladas, caducas; bractéolas 1,2–1,4 \times c. 0,3 mm, lineares, fusco-pubescentes, caducas. **Flores** 4,5–5 mm compr.; **hipanto** ca. $0,5 \times 1$ mm, curtamente campanulado; **cálice** ca. $4 \times 3,5$ mm, campanulado, externamente densamente velutino, internamente densamente seríceo, lábio superior 2,8–3 \times 2,5–2,8 mm, emarginado, lábio inferior com lobos laterais 2,3–2,5 \times 2,3 mm, triangulares, lobo inferior 2,8–3 \times 1,8 mm, oblongo; **pétalas** com ápice cor de vinho, estandarte 3–3,2 \times 4,2–4,5 mm + unguículo 1,5–1,7 mm compr., largamente oval, emarginado, alas 3,5–3,8 \times 1,5 mm + unguículo 0,8–1 mm, oblongas, ápice arredondado, margem adaxial com base cordada, pétalas da carena 2,8–3 \times 1,5 mm + unguículo 1–1,2 mm compr., oblongas, ápice arredondado; **bainha estaminal** 1,8–2 mm compr.; **ovário** 1,9–2 \times 0,8 mm, canescente-lanoso, 2-ovulado, estilete ca. 2,5 mm compr., estigma truncado. **Fruto** 17–20 \times 11–12 mm, largamente elíptico a largamente oboval, suborbicular, ca. 1,5 \times mais longo do que largo, plano-compresso; valvas rígido-coriáceas, estriadas pelas nervuras salientes, fusco-velutinas. **Sementes** 1 (2), 9–10 mm diâm., suborbitulares, plano-compressas; testa lisa, marrom-claro; hilo ca. 1 mm compr., oblongo.

COMENTÁRIO

Tabaroa caatingicola é uma árvore endêmica da Caatinga do sudoeste da Bahia e norte de Minas Gerais, ocorrendo também em encaves de Caatinga no Cerrado do leste de Goiás. O habitat típico dessa espécie é o de florestas estacionais desciduais. Pode ser diagnosticada pela combinação das folgas imparipinadas com os folíolos opostos, flores pequenas com pétalas vináceas e frutos secos, indeiscentes e suborbitulares.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Caatinga

Tipos de Vegetação

Caatinga (stricto sensu), Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia)

Centro-Oeste (Goiás)

Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giullietti, 2587, RB, HUEFS, K, Bahia, **Typus**
L.P. Queiroz, 7827, K,  (K000893037), HUEFS, Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Tabaroa caatingicola* L.P.Queiroz, G.P.Lewis & M.F.Wojc.



Figura 2: *Tabaroa caatingicola* L.P.Queiroz, G.P.Lewis & M.F.Wojc.



Figura 3: *Tabaroa caatingicola* L.P.Queiroz, G.P.Lewis & M.F.Wojc.



Figura 4: *Tabaroa caatingicola* L.P.Queiroz, G.P.Lewis & M.F.Wojc.



Figura 5: *Tabaroa caatingicola* L.P.Queiroz, G.P.Lewis & M.F.Wojc.



Figura 6: *Tabaroa caatingicola* L.P.Queiroz, G.P.Lewis & M.F.Wojc.

BIBLIOGRAFIA

Queiroz, L.P., Lewis, G.P. & Wociechowski, M.F. 2010. *Tabaroa*, a new genus of Leguminosae tribe Brongniartieae from Brazil. Kew Bulletin 65: 189-203.