

Talipariti Fryxell

Massimo G. Bovini

Jardim Botânico do Rio de Janeiro; bovinimassimo@gmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Talipariti*, *Talipariti pernambucense*.

COMO CITAR

Bovini, M.G. 2020. *Talipariti* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB9255>.

DESCRIÇÃO

Arbusto 1,5-8 m alt., muito ramificado. Folhas com pecíolos ca. 11 cm compr., glabrescentes. Lâmina foliar 10-15 x 13-18 cm, cordiforme, base cordada, ápice acuminado, margem levemente crenada, coriácea, discolor; face adaxial glabrescente, tricomas estrelados, face abaxial tomentosa, tricomas estrelados. Nectários presentes na face abaxial, na base da nervuras mediana e nas duas em torno. Estípulas oblongo-lanceolada, 1,5-4 x 0,8-1,4 cm, séssil, pubérula, tricomas estrelados. Inflorescência cimosa ou às vezes flores solitárias, axilares. Pedicelo ca. 3 cm compr. Epicálice cupuliforme, 8-11 bractéolas, triangulares ou lanceoladas, livres até a metade do comprimento do epicálice ou menor. Cálice ca. 1,7 cm compr., pentâmero, lobos lanceolados a agudos, ca. 15 x 7 mm, livres mais que a metade do comprimento do cálice, com um nectário na nervura central da cada lobo. Corola amarela, quando murcha alaranjada, sem mácula no centro, cinco pétalas 4-6 cm compr; tubo estaminal ca. 3 cm compr, glabro, com 5 dentes no ápice, filetes ca. 2 mm livres. Ovário 5 locular, 5 estigmas capitados, amarelos. Cápsula loculicida, subglobosa, 5 locular, ca. 1,5 x 1,5 cm, pubescente, tricomas estrelados e simples, amarelados ou pardacentos; sementes numerosas, reniformes, ca. 4 mm compr, papilosas.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Manguezal

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amapá, Pará)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)

Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

Possíveis ocorrências

Norte (Roraima)

BIBLIOGRAFIA

Fryxell, P.A. 2001. *Talipariti* (Malvaceae), a segregate from *Hibiscus*. Contributions from the University of Michigan Herbarium 23. Pp. 225-270.

Talipariti pernambucense (Arruda) Bovini

Tem como sinônimo

basiônimo *Hibiscus pernambucensis* Arruda

DESCRIÇÃO

Arbusto 1,5-8 m alt., muito ramificado. Folhas com pecíolos ca. 11 cm compr., glabrescentes. Lâmina foliar 10-15 x 13-18 cm, inteira, cordiforme, base cordada, ápice acuminado, margem levemente inteira a crenada, coriácea, discolor; face adaxial glabrescente, tricomas estrelados, face abaxial tomentosa, tricomas estrelados. Nectários presentes na face abaxial, na base da nervuras mediana e nas duas em torno. Estípulas oblongo-lanceolada, 1,5-4 x 0,8-1,4 cm, séssil, pubérula, tricomas estrelados. Inflorescência cimosa ou às vezes flores solitárias, axilares. Pedicelo ca. 3 cm compr. Epicálice cupuliforme, 8-11 bractéolas, triangulares ou lanceoladas, livres até a metade do comprimento do epicálice ou menor. Cálice ca. 1,7 cm compr., pentâmero, lobos lanceolados a agudos, ca. 15 x 7 mm, livres mais que a metade do comprimento do cálice, com um nectário na nervura central da cada lobo. Corola amarela, quando passada alaranjada, sem mácula no centro, cinco pétalas 4-6 cm compr; tubo estaminal ca. 3 cm compr, glabro, com 5 dentes no ápice, filetes ca. 2 mm livres. Ovário 5 locular, 5 estigmas capitados, amarelos. Cápsula loculicida, subglobosa a ovoide, 5 locular, ca. 1,5 x 1,5 cm, pubescente, tricomas estrelados e simples, amarelados ou pardacentos; sementes numerosas, 5 mm compr., reniformes, ca. 4 mm compr, papilosas.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Manguezal

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amapá, Pará)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)

Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)


Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)


Possíveis ocorrências

Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.G. Bovini, 657, RB, 308705,  (RB00216362), Rio de Janeiro

Krapovickas, A, 11351, SPF, 308705,  (SPF00048410), São Paulo

Funez, L.A., 6420, FURB, 308705,  (FURB54580), Santa Catarina

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Talipariti pernambucense* (Arruda) Bovini



Figura 2: *Talipariti pernambucense* (Arruda) Bovini

BIBLIOGRAFIA

- Bovini, M.G. 2010. A new combination in the genus *Talipariti* (Malvacee). *Rodriguésia* 61 (suplemento): 19-21.
Hochreutiner, B.P.G. 1900. Revision du Genre *Hibiscus*. *Ann. Conserv. Jard. Gen.* 4: 23-191.