

# Triphora Nutt.

Thiago Erir Cadete Meneguzzo

Jardim Botânico do Rio de Janeiro; botanica@meneguzzo.net.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Triphora*, *Triphora amazonica*, *Triphora hassleriana*, *Triphora pusilla*, *Triphora surinamensis*, *Triphora uniflora*.

## COMO CITAR

Meneguzzo, T.E.C. 2020. *Triphora* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB32091>.

## DESCRIÇÃO

Ervas, terrícolas, simpodiais com caules únicos e indivisos. Raízes poucas, comumente tuberóides. Caule delgado. Folhas poucas, bainhas fechadas, limbo sésstil e com formatos diversos ao longo do caule, por vezes sem limbo e somente bainhas. Inflorescência racemosa ou uniflora. Flores dialisépalas, dialipétalas, labelo trilobado com carenas no disco, coluna semi-clavada. Frutos comumente encontrados.

## COMENTÁRIO

*Triphora* é um gênero americano ocorrente dos trópicos as regiões temperadas. Geralmente ocorrentes em sub-bosque sobre serrapilheira na forma de populações gregárias. A falta de coletas contribui para o baixo conhecimento do gênero, o qual necessita de revisão e especialmente compreender melhor a aplicação dos nomes já publicados com as entidades biológicas existentes e suas respectivas distribuições.

### Forma de Vida

Erva

### Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

### Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

### Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

### Distribuição Geográfica

#### Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará)

Nordeste (Bahia)

Centro-Oeste (Distrito Federal)

Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)

#### Possíveis ocorrências

Norte (Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins)

Nordeste (Bahia, Maranhão)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)  
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

### CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Plantas áfilas ..... **P. pusilla**
- 1'. Plantas folhosas ..... 2
2. Folhas ovadas a lanceoladas; flores com lobos laterais de comprimento subigual ao mediano ..... **P. surinamensis**
- 2'. Folhas ovadas a reniformes; flores com lobos laterais de comprimento mais curto ao mediano ..... 3
3. Flores com lobo mediano rombiforme e ápice obtuso ..... **P. amazonica**
- 3'. Flores com lobo mediano de outras formas ..... 4
4. Inflorescência racemosa; flores com lobos laterais oblíquo-oblongos, lobo mediano oblongo ..... **P. hassleriana**
- 4'. Inflorescência uniflora; flores com lobos laterais oblíquo-ovados, lobo mediano cordado ..... **P. uniflora**

### BIBLIOGRAFIA

- Ackerman, J.D. (2014) Orchid Flora of the Greater Antilles. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 109: 1–625.  
Medley, M.E. (1996) Notes on collections of *Triphora* (*Orchidaceae*) from the American tropics. *Selbyana* 17: 83–87.

# Triphora amazonica Schltr.

## Tem como sinônimo

heterotípico *Triphora latifolia* G.M.Luer

## DESCRIÇÃO

**Folha:** presença presente(s); **forma limbo das folha(s) basal(ais)** ovado(s) reniforme(s). **Inflorescência:** tipo uniflora ou racemosa(s). **Flor:** cor branca à rosa; **comprimento lobo(s) lateral(ais) em relação ao lobo mediano** mais curta que; **lobo(s) lateral(ais) forma** obliquamente semi elíptico(s); **ápice(s)** arredondado(s); **labelo lobo mediano forma** rômbo(s); **ápice(s)** obtuso(s).

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará)

Nordeste (Bahia)

### Possíveis ocorrências

Norte (Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins)


Nordeste (Maranhão)


Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

## MATERIAL TESTEMUNHO

Ferreira, P.A., 20, ALCB (ALCB008332), Bahia

Saddi, E., 764, RB, 548896,  (RB00714552), Bahia

Maia, L.A., 610, INPA, 86842,  (INPA0086842), Amazonas

# *Triphora hassleriana* (Cogn. ex Chodat & Hassl.) Schltr.

## Tem como sinônimo

heterotípico *Triphora lutea* Schltr. ex Mansf.

heterotípico *Triphora santamariensis* Portalet

## DESCRIÇÃO

**Folha:** presença presente(s); **forma limbo das folha(s) basal(ais)** ovado(s) reniforme(s). **Inflorescência:** tipo racemosa(s). **Flor:** cor branca; **comprimento lobo(s) lateral(ais) em relação ao lobo mediano** mais curta que; **lobo(s) lateral(ais) forma** obliquamente oblongo(s); **ápice(s)** arredondado(s); **labelo lobo mediano forma** oblongo(s); **ápice(s)** arredondado(s).

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Tipos de Vegetação

Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Sul (Rio Grande do Sul)

### Possíveis ocorrências

Sul (Paraná, Santa Catarina)

## MATERIAL TESTEMUNHO

Portalet, A.A., s.n., SP, 399306,  (SP002428), SMDB, 9965,  (SMDB009965), Rio Grande do Sul, **Typus**

# *Triphora pusilla* (Rchb.f. & Warm.) Schltr.

## Tem como sinônimo

basiônimo *Pogonia pusilla* Rchb.f. & Warm.

heterotípico *Triphora heringeri* Pabst

## DESCRIÇÃO

**Folha:** presença ausente(s) ( áfila(s) ); **forma limbo das folha(s) basal(ais)** não aplicável. **Inflorescência:** tipo uniflora. **Flor:** cor rosa; **comprimento lobo(s) lateral(ais) em relação ao lobo mediano** mais curta que; **lobo(s) lateral(ais) forma** obliquamente ovado(s); **ápice(s)** arredondado(s); **labelo lobo mediano forma** ovado(s); **ápice(s)** agudo(s).

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Cerrado

## Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Distrito Federal)

Sudeste (Minas Gerais)

# *Triphora surinamensis* (Lindl.) Britton

## Tem como sinônimo

basônimo *Pogonia surinamensis* Lindl.

heterotípico *Pogonia carnosula* Rehb.f.

heterotípico *Triphora carnosula* (Rehb.f.) Schltr.

heterotípico *Triphora duckei* Schltr.

## DESCRIÇÃO

**Folha:** presença presente(s); **forma limbo das folha(s) basal(ais)** ovado(s) lanceado(s). **Inflorescência:** tipo racemosa(s). **Flor:** cor rosa; **comprimento lobo(s) lateral(ais) em relação ao lobo mediano** subiguais; **lobo(s) lateral(ais) forma** obliquamente semi elíptico(s); **ápice(s)** agudo(s); **labelo lobo mediano forma** oblongo(s); **ápice(s)** arredondado(s).

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Tipos de Vegetação

Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará)

### Possíveis ocorrências


Norte (Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins)


Nordeste (Bahia, Maranhão)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

## MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, s.n., RB, 14784,  (RB00542718), MG (MG016987), Pará, **Typus**

R. Spruce, 2908, P, 14784 (P00347575), K, 14784,  (K000463765), Amazonas, **Typus**

## BIBLIOGRAFIA

Ilkiu-Borges, A.L. & Cardoso, A.L.R. 1996. Notas preliminares sobre a flora orquidológica do Estado do Pará, Brasil. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, série Botânica 12(2): 183-205.

# *Triphora uniflora* A.C.Ferreira, Baptista & Pansarin

## DESCRIÇÃO

**Folha:** presença presente(s); **forma limbo das folha(s) basal(ais)** ovado(s) reniforme(s). **Inflorescência:** tipo uniflora. **Flor:** cor branca à rosa; **comprimento lobo(s) lateral(ais) em relação ao lobo mediano** mais curta que; **lobo(s) lateral(ais) forma** obliquamente ovado(s); **ápice(s)** arredondado(s); **labelo lobo mediano forma** cordado(s); **ápice(s)** arredondado(s).

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Cerrado, Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Distrito Federal)

Sudeste (São Paulo)

Sul (Paraná)

### Possíveis ocorrências

Norte (Rondônia, Tocantins)

Nordeste (Bahia)

Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

## MATERIAL TESTEMUNHO

Maury, C.M., s.n., CEN (CEN00015181), Distrito Federal

Batista, J.A.N., 1401, CEN (CEN00050852), Distrito Federal, **Typus**

Caxambu, 2917, HCF (HCF000017916), Paraná