

Triumfetta L.

Massimo G. Bovini

Jardim Botânico do Rio de Janeiro; bovinimassimo@gmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Triumfetta*, *Triumfetta althaeoides*, *Triumfetta bartramia*, *Triumfetta bogotensis*, *Triumfetta grandiflora*, *Triumfetta lappula*, *Triumfetta longicoma*, *Triumfetta multiglandulosa*, *Triumfetta obscura*, *Triumfetta sampaioi*, *Triumfetta semitriloba*.

COMO CITAR

Bovini, M.G. 2020. *Triumfetta* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB9260>.

DESCRIÇÃO

Árvores, arbustos a subarbustos. Ramos às vezes esfoliante, pubescente, glabrescente ou glabros, tricomas simples e estralados, alvos a ferrugíneos. Folhas estipuladas e pecioladas, com lâminas inteiras a 3-lobadas, geralmente ovadas, raramente lanceolada, membranáceas, ápice aguda a acuminada, base cordada ou obtusa, margem irregularmente serreada, com os dentes basais transformados em nectários. Inflorescências cimosas, axilares ou terminais; flores monoclinas, pediceladas, epicálice ausente; brácteas caducas, triangulares; sépalas 5, leve ou profundamente cuculadas, longamente apiculadas no ápice; pétalas 5, amarelas, unguiculadas, unha com tricomas estrelados na margem, raramente ausente; estames 10-41; anteras lineares, rimosas; estaminódios ausentes; disco extra estaminal levemente 5-10-lobado, membranáceo, ciliado na margem; ovário 3-10-locular, globoso, 2 óvulos por lóculo; estilete colunar; estigmas denteados ou inconspícuos; androginóforo presente, com 5 glândulas de formas variadas. Fruto núcula, globosa, ocasionalmente ovóide, indeiscente, equinado, com até 150 espinhos, superfície glabra ou pilosa; espinhos retos ou uncinados, espículas retas ou uncinadas, com tricomas simples, retróscos, diversamente distribuídos. Sementes sem alas.

Forma de Vida

Arbusto, Subarbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Tocantins)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

- 1. Inflorescência terminal, paniculiforme; frutos com espinhos não uncinados *T. multiglandulosa*
- 1. Inflorescência axilar, nunca paniculiforme; frutos com espinhos uncinados 2
- 2. Sépalas na antese 15–20 mm compr. 3
- 3. Frutos esparsamente espinescente (ca. 75 espinhos) *T. longicoma* A.St.-Hil.
- 3. Frutos densamente espinescente (ca. 200 espinhos) *T. grandiflora* Vahl
- 2. Sépalas na antese 3.5–11 mm compr. 4
- 4. Lâmina foliar elíptica *T. obscura* A.St.-Hil.
- 4. Lâmina foliar ovada e/ou rômbrica 5
- 5. Pétalas e glândulas no androginóforo ausentes *T. lappula* L.
- 5. Pétalas e glândulas no androginóforo presentes 6
- 6. Sépalas 3–3.5 mm compr.; estames 5 *T. sampaioi* Monteiro
- 6. Sépalas 4–11 mm compr.; estames 10–30 7
- 7. Sépalas vináceas, fortemente cuculadas; androginóforo ca. 0.5 mm compr.; frutos velutinos *T. rhomboidea* Jacq.
- 7. Sépalas verde-amarelas, não cuculadas; androginóforo 0.75–1 mm compr.; frutos glabros ou pubescentes 8
- 8. Estigma inteiro; frutos 4–5-locular *T. althaeoides* Lam.
- 8. Estigma trifido; frutos 2–3-locular 9
- 9. Lâmina foliar na face adaxial com tricomas estrelados; pétalas 6–7 mm compr., elípticas; estames 15–25 *T. semitriloba* Jacq.
- 9. Lâmina foliar na face adaxial com tricomas estrelados e simples; pétalas 8–9 mm compr., amplamente obovada; estames 25–30 *T. bogotensis* DC.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Triumfetta* L.

BIBLIOGRAFIA

Lay, K. K. 1950. *Triumfetta*. *Annals of the Missouri Botanical Garden* 37: 315-395.
 Tchá, M.; Sales, M. F. & Esteves, G. L. 2002. TILIACEAE no Estado de Pernambuco. *Hoehnea* (São Paulo) 29: 1-18.
 Esteves, G. L. 1990. Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil: TILIACEAE. *Bol. de Botânica, Universidade de São Paulo*, 12: 61-66.

- Gual-Diaz, M. & Diego-Perez, N. 2018. Diversidad de las subfamilias Grewioideae y Tilioideae (Malvaceae) en Guerrero, México. *Acta Botanica Mexicana* 122:33-96.
- Souza, B. M. & Esteves, G. L. 2002. Tiliaceae. In *Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo, Brasil*. (Wanderley, M.G.L. et al., Orgs.) 2: 331-341.
- Oliveira, A.C.B.; Esteves, G. L. & Cavalcanti, T. B. 2009. Tiliaceae. In *Flora do Distrito Federal*. (Cavalcanti, T.B. et al. Orgs.). 7: 269-282.

Triumfetta althaeoides Lam.

Tem como sinônimo

homotípico *Triumfetta altheoides* Lam.

heterotípico *Triumfetta surinamensis* Steud.

DESCRIÇÃO

Caulé: cor ferrugíneo(s); **indumento** pubescente(s); **tricoma(s)** estrelado(s). **Folha:** **estípula(s)** linear(es); **comprimento da estípula(s)** 0.5 cm ou menos; **lâmina(s)** ovada(s)/levemente 3 - 5 lobada(s)/inteira; **ápice(s)** agudo(s); **base** cuneada(s); **consistência** membranácea(s); **indumento na(s) face(s) adaxial** tomentoso(s); **margem(ns)** levemente serrada(s); **tricoma(s)** estrelado(s). **Inflorescência:** **tipo** axilar(es) congesta(s)/terminal(ais) congesta(s)/não paniculiforme(s). **Flor:** **corola** amarela; **estigma(s)** inteiro; **glândula(s) na(s) base do androginóforo** presente(s). **Fruto:** **tamanho** maior(es) que 0.5 cm diâm.; **espinho(s)** reto(s)/falcado(s); **espínula(s)** falcada(s); **indumento** piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pecíolo 4-6 cm compr.

Lâminas foliares 12-14 x 11-13 cm

Frutos com mais de 200 espinhos

Forma de Vida

Subarbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Amapá, Pará)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Sergipe)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Ratter, 1023, RB, 153691,  (RB00652156), Mato Grosso

BIBLIOGRAFIA

Lay, K.K. 1950. The American species of *Triumfetta* L. *Annals of the Missouri Botanical Garden* 37(3):315-395.

Tchá, M.; Sales, M.F. & Esteves, G. L. 2002. Tiliaceae no Estado de Pernambuco. *Hoehnea* 21(1):1-18.

Triumfetta bartramia L.

Tem como sinônimo

heterotípico *Triumfetta rhomboidea* Jacq.

DESCRIÇÃO

Caule: cor pardo vermelho; **indumento** glabro(s); **tricoma(s)** sem tricoma(s). **Folha:** **estípula(s)** linear(es); **comprimento da estípula(s)** 0.5 cm ou menos; **lâmina(s)** ovada(s)/3 - 5 lobada(s)/levemente 3 - 5 lobada(s)/rômbica(s) à ovada(s); **ápice(s)** acuminado(s); **base** obtusa(s); **consistência** membranácea(s); **indumento na(s) face(s) adaxial** glabrescente(s); **margem(ns)** serrada(s); **tricoma(s)** estrelado(s). **Inflorescência:** **tipo** axilar(es) congesta(s)/não paniculiforme(s). **Flor:** **corola** amarela; **estigma(s)** inteiro; **glândula(s) na(s) base do androginóforo** presente(s). **Fruto:** **tamanho** até 0.5 cm diâm.; **espinho(s)** falcado(s); **espínula(s)** falcada(s); **indumento** piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pecíolo 3-5 cm compr.

Lâmina foliar 4-5 x 7-8 cm, frequentemente profundamente 3-5 lobadas

Frutos ca. 80 espinhos

Forma de Vida

Subarbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Sergipe)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Burchell, 8747, K,  (K001209569)

Triumfetta bogotensis DC.

DESCRIÇÃO

Caulo: cor pardo; **indumento** glabrescente(s); **tricoma(s)** simples/estrelado(s). **Folha:** **estípula(s)** lanceolada(s); **comprimento da estípula(s)** 0.5 cm ou menos; **lâmina(s)** lanceolada(s)/ovada(s)/bicolor(es)/levemente 3 - 5 lobada(s)/inteira; **ápice(s)** acuminado(s); **base** obtusa(s)/levemente cordada(s); **consistência** membranácea(s); **indumento na(s) face(s) adaxial** glabrescente(s); **margem(ns)** serrada(s); **tricoma(s)** simples. **Inflorescência:** **tipo** axilar(es) congesta(s)/não paniculiforme(s). **Flor:** **corola** amarela; **estigma(s)** trifido(s); **glândula(s) na(s) base do androginóforo** presente(s). **Fruto:** **tamanho** até 0.5 cm diâm.; **espinho(s)** reto(s); **espínula(s)** falcada(s); **indumento** piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Peciolo 2-6 cm compr.
Lâmina foliar 3-12 x 1,6-6 cm
Frutos com ca. 45 espinhos retos

Forma de Vida

Arbusto, Subarbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo Limpo, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia, Ceará, Pernambuco)

Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. J. N. Rodal, 243, NY,  (NY00884896), Pernambuco

BIBLIOGRAFIA

Tchá, M.; Sales, M.F. & Esteves, G. L. 2002. Tiliaceae no Estado de Pernambuco. Hoehnea 29(1): 1-18.

Triumfetta grandiflora Vahl

Tem como sinônimo

heterotípico *Triumfetta nemoralis* A.St-Hil.

DESCRIÇÃO

Caulo: cor ferrugíneo(s)/pardo; **indumento** glabrescente(s); **tricoma(s)** simples/estrelado(s). **Folha:** **estípula(s)** lanceolada(s); **comprimento da estípula(s)** 0.5 cm ou menos; **lâmina(s)** ovada(s)/bicolor(es)/inteira; **ápice(s)** acuminado(s); **base** cuneada(s); **consistência** cartácea(s); **indumento na(s) face(s) adaxial** glabrescente(s); **margem(ns)** serreada(s); **tricoma(s)** simples/estrelado(s). **Inflorescência:** **tipo** axilar(es) congesta(s)/terminal(ais) congesta(s)/não paniculiforme(s). **Flor:** **corola** amarela; **estigma(s)** inteiro; **glândula(s) na(s) base do androginóforo** presente(s). **Fruto:** **tamanho** maior(es) que 0.5 cm diâm.; **espinho(s)** reto(s); **espínula(s)** falcada(s); **indumento** piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pecíolo 2-5 cm compr.

Lâmina foliar 4 - 13 x 2-5 cm

Fruto ca. 200 espinhos

Forma de Vida

Arbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. G. Kuhlmann, 522, RB, 653,  (RB00437132), Rio de Janeiro

Triumfetta lappula L.

Tem como sinônimo

heterotípico *Triumfetta heterophylla* Lam.

heterotípico *Triumfetta hostmanniana* Miq.

DESCRIÇÃO

Caulé: cor pardo; **indumento** pubescente(s)/glabrescente(s); **tricoma(s)** estrelado(s). **Folha:** **estípula(s)** lanceolada(s); **comprimento da estípula(s)** 0.5 cm ou menos; **lâmina(s)** ovada(s)/3 - 5 lobada(s)/concolor(es)/levemente 3 - 5 lobada(s)/inteira; **ápice(s)** acuminado(s); **base** cuneada(s); **consistência** membranácea(s); **indumento na(s) face(s) adaxial** glabrescente(s); **margem(ns)** serreada(s); **tricoma(s)** simples/estrelado(s). **Inflorescência:** **tipo** axilar(es) congesta(s)/terminal(ais) congesta(s)/não paniculiforme(s). **Flor:** **corola** ausente(s); **estigma(s)** inteiro; **glândula(s) na(s) base do androginóforo** inconspícua(s). **Fruto:** **tamanho** até 0.5 cm diâm.; **espinho(s)** reto(s); **espínula(s)** falcada(s); **indumento** piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pecíolo

Lâmina foliar

Frutos

Forma de Vida

Subarbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará)

Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Spruce, 851, K,  (K001209565), Pará

BIBLIOGRAFIA

Faun. Fl. Brit. Gui. 1258 nomen

Triumfetta longicoma A.St.-Hil.

DESCRIÇÃO

Caulé: cor pardo; **indumento** glabrescente(s); **tricoma(s)** estrelado(s). **Folha:** **estípula(s)** lanceolada(s); **comprimento da estípula(s)** 0.5 cm ou menos; **lâmina(s)** ovada(s)/concolor(es)/inteira; **ápice(s)** acuminado(s); **base** cordada(s); **consistência** membranácea(s); **indumento na(s) face(s) adaxial** tomentoso(s); **margem(ns)** serrada(s); **tricoma(s)** estrelado(s). **Inflorescência:** **tipo** axilar(es) congesta(s)/não paniculiforme(s). **Flor:** **corola** amarela; **estigma(s)** inteiro; **glândula(s) na(s) base do androginóforo** presente(s). **Fruto:** **tamanho** até 0.5 cm diâm.; **espinho(s)** falcado(s); **espínula(s)** falcada(s); **indumento** piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pecíolo 2-3 cm compr.
Lâmina foliar ca. 8 x 4-6 cm
Fruto ca. 70 espinhos

Forma de Vida

Arbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Cerrado

Tipos de Vegetação

Campo Rupestre

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Y. E. J. Mexia, 5821, NY,  (NY00996610), Minas Gerais

Triumfetta multiglandulosa A.J.Fernandes-Jr. & Ferrucci

DESCRIÇÃO

Caulo: cor pardo; **indumento** tomentoso(s); **tricoma(s)** simples/estrelado(s)/glandular(es). **Folha:** **estípula(s)** lanceolada(s); **comprimento da estípula(s)** 0.6 cm ou mais; **lâmina(s)** ovada(s)/bicolor(es)/inteira; **ápice(s)** agudo(s); **base** cordada(s); **consistência** membranácea(s); **indumento na(s) face(s) adaxial** tomentoso(s); **margem(ns)** serreada(s); **tricoma(s)** glandular(es)/estrelado(s). **Inflorescência:** **tipo** terminal(ais) congesta(s)/paniculiforme(s). **Flor:** **corola** amarela; **estigma(s)** inteiro; **glândula(s) na(s) base do androginóforo** presente(s). **Fruto:** **tamanho** até 0.5 cm diâm.; **espinho(s)** reto(s); **espínula(s)** reta(s); **indumento** piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pecíolo 5-9.5 cm compr.
Lâmina foliar 5-15 x 4.4 - 14.5 cm
Frutos 50-60 espinhos retos

Forma de Vida

Arbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hamilton Garboggini Pinho dos Santos, 45, CEN, 20834,  (CEN00020834), Goiás, **Typus**

Triumfetta obscura A.St.-Hil.

DESCRIÇÃO

Caulo: cor pardo; **indumento** glabro(s)/glabrescente(s); **tricoma(s)** estrelado(s)/sem tricoma(s). **Folha:** **estípula(s)** lanceolada(s); **comprimento da estípula(s)** 0.5 cm ou menos; **lâmina(s)** lanceolada(s)/levemente 3 - 5 lobada(s); **ápice(s)** acuminado(s); **base** cuneada(s); **consistência** membranácea(s); **indumento na(s) face(s) adaxial** tomentoso(s); **margem(ns)** serreada(s); **tricoma(s)** estrelado(s). **Inflorescência:** **tipo** axilar(es) congesta(s)/terminal(ais) congesta(s)/não paniculiforme(s). **Flor:** **corola** amarela; **estigma(s)** inteiro; **glândula(s) na(s) base do androginóforo** presente(s). **Fruto:** **tamanho** até 0.5 cm diâm.; **espinho(s)** falcado(s); **espínula(s)** falcada(s); **indumento** piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pecíolo 3-5 cm compr
Lâmina foliar 11-13 x 4-6 cm
Frutos ca. 100 espinhos

Forma de Vida

Arbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Campo Limpo, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Distrito Federal)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. Almeida, 1395, RB, 156570,  (RB00437137), Rio de Janeiro

Triumfetta sampaioi Mont.

DESCRIÇÃO

Caule: cor pardo; **indumento** pubescente(s); **tricoma(s)** simples/estrelado(s). **Folha:** **estípula(s)** lanceolada(s); **comprimento da estípula(s)** 0.5 cm ou menos; **lâmina(s)** ovada(s)/3 - 5 lobada(s)/bicolor(es); **ápice(s)** acuminado(s); **base** obtusa(s)/cuneada(s); **consistência** membranácea(s); **indumento na(s) face(s) adaxial** tomentoso(s); **margem(ns)** serreada(s); **tricoma(s)** simples/estrelado(s). **Inflorescência:** **tipo** axilar(es) congesta(s)/não paniculiforme(s). **Flor:** **corola** amarela; **estigma(s)** inteiro; **glândula(s) na(s) base do androginóforo** presente(s). **Fruto:** **tamanho** até 0.5 cm diâm.; **espinho(s)** reto(s); **espínula(s)** falcada(s); **indumento** piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pecíolo ca. 3 cm compr.
Lâmina foliar ca. 9 x 3 cm
Frutos 30-50 espinhos falcados

Forma de Vida

Subarbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Pará, Tocantins)

Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão)

Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Eiten, 4717B, K,  (K001209598), Maranhão

BIBLIOGRAFIA

Lilloa 3: 244 (1938).

Triumfetta semitriloba Jacq.

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Triumfetta semitriloba*, .

Tem como sinônimo

heterotípico *Triumfetta abutiloides* A.St.-Hil.

heterotípico *Triumfetta semitriloba* var. *brasiliensis* K.Schum

DESCRIÇÃO

Caulé: cor pardo vermelho/ferrugíneo(s); **indumento** glabrescente(s); **tricoma(s)** estrelado(s). **Folha:** **estípula(s)** linear(es); **comprimento da estípula(s)** 0.5 cm ou menos; **lâmina(s)** lanceolada(s)/ovada(s)/3 - 5 lobada(s)/bicolor(es); **ápice(s)** acuminado(s); **base** obtusa(s)/cuneada(s); **consistência** membranácea(s); **indumento na(s) face(s) adaxial** tomentoso(s); **margem(ns)** serreada(s); **tricoma(s)** simples/estrelado(s). **Inflorescência:** **tipo** axilar(es) congesta(s)/terminal(ais) congesta(s)/não paniculiforme(s). **Flor:** **corola** amarela; **estigma(s)** trifido(s); **glândula(s) na(s) base do androginóforo** presente(s). **Fruto:** **tamanho** até 0.5 cm diâm.; **espinho(s)** reto(s); **espínula(s)** falcada(s); **indumento** piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pecíolo 3-4 cm compr.

Lâmina foliar 3-7 x 1-6 cm

Frutos 50-75 espinhos

Forma de Vida

Arbusto, Subarbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Y. Mexia, 4733, K,  (K001209521), K,  (K001209524), NY,  (NY00996645), NY,  (NY00996646), RB, 352349, ,  (RB00445919), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Triumfetta semitriloba* Jacq.



Figura 2: *Triumfetta semitriloba* Jacq.

BIBLIOGRAFIA

- Tchá, M.; Sales, M.F. & Esteves, G. L. 2002. Tiliaceae no Estado de Pernambuco. *Hoehnea* 21(1):1-18.
- Souza, B.M. & Esteves, G. L. 2002. Tiliaceae. In *Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo*. (Wanderley, M.G.L. et al. Orgs.) 2: 331-341.
- Oliveira, A.C.B.; Esteves, G. L. & Cavalcanti, T. B. 2009. Tiliaceae. In *Flora do Distrito Federal*. (Cavalcanti, T.B. et al. Orgs.). 7: 269-282.