

Trizeuxis Lindl.

Eric de Camargo Smidt

Universidade Federal do Paraná; ecsmidt@gmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Trizeuxis*, *Trizeuxis falcata*.

COMO CITAR

Smidt, E.C. 2020. *Trizeuxis* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB12343>.

DESCRIÇÃO

Erva epífita; rizoma curto. Pseudobulbo oblongo, comprimido lateralmente, coberto por bainhas foliares equitantes, unifoliado no ápice. Folha linear-ligulada, assimétrica, ápice agudo. Inflorescência multiflora, lateral, paniculada. Flores cremes com labelo amarelo. Sépala dorsal, oblonga. Sépalas laterais oblongas, conadas até o terço final. Pétalas ovais. Labelo oblongo, ligeiramente trilobado.

COMENTÁRIO

Trizeuxis foi proposto por John Lindley em *Collectanea Botanica* 2, em 1821. A espécie tipo do gênero é a *Trizeuxis falcata* Lindley.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre)

Nordeste (Bahia, Ceará)

Centro-Oeste (Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Santa Catarina)

Possíveis ocorrências

Nordeste (Alagoas)

BIBLIOGRAFIA

PRIDGEON, A.M., CRIBB, P.J., CHASE, M.W. & RASMUSSEN, F.N. (eds.) 2014. Genera Orchidacearum Volume 5: Epidendroideae (Part two); page 383 ff., Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198507130

Trizeuxis falcata Lindl.

Tem como sinônimo

heterotípico *Trizeuxis andina* Schltr.

DESCRIÇÃO

Erva epífita; rizoma curto. Pseudobulbo oblongo, 10 x 3mm, comprimido lateralmente, coberto por bainhas foliares equitantes, unifoliado no ápice. Folha linear-ligulada, 3-10 x 0,2-0,5cm assimétrica, ápice agudo. Inflorescência multiflora, lateral, paniculada. Flores cremes com labelo amarelo. Sépala dorsal, 1,5 x 0,5mm, oblonga. Sépalas laterais 1,5 x 1,2mm, oblongas, conadas até o terço final. Pétalas 1,2 x 1,5mm, ovais. Labelo 2 x 1mm, oblongo, ligeiramente trilobado.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre)

Nordeste (Bahia, Ceará)

Centro-Oeste (Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Santa Catarina)

Possíveis ocorrências


Nordeste (Alagoas)


MATERIAL TESTEMUNHO


J. A. Jesus, 250, CEPEC,  (CEPEC00004962), Bahia

Lima-Verde, L.W., 3511, EAC,  (EAC0049291), Ceará


Souza, V.C. et al., 21656, ESA,  (ESA062786), São Paulo


Engels, M.E., 2865, CNMT, 1919,  (CNMT001919), Mato Grosso

Schwirkowski, P., 2455, FURB, 1919,  (FURB55735), Santa Catarina


J.M. Silva R.A. Bonaldi D.A. Roher, 8407, HCF, 1919,  (HCF000017917), Paraná

Sucre, D., 8314, ICN, 1919,  (ICN00041322), Espírito Santo

Schwirkowski, P., 2455, MBM, 1919,  (MBM423585), Santa Catarina

G. T. Prance, 7878, NY, 1919,  (NY00625786), Acre

BRADE, 14108, RB, 10247,  (RB00260150), Minas Gerais

REJAN GUEDES, 601, RB, 224435,  (RB00260428), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Trizeuxis falcata* Lindl.



Figura 2: *Trizeuxis falcata* Lindl.