

Veyretia Szlach.

Thiago Erir Cadete Meneguzzo

Jardim Botânico do Rio de Janeiro; botanica@meneguzzo.net.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Veyretia*, *Veyretia aphylla*, *Veyretia hassleri*, *Veyretia sagittata*, *Veyretia simplex*.

COMO CITAR

Meneguzzo, T.E.C. 2020. *Veyretia* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB12360>.

DESCRIÇÃO

Ervas terrícolas. Folhas ausentes durante a antese e virtualmente desconhecidas para as espécies. Inflorescência racemosa simples. Sépala dorsal adnata as pétalas, sépalas laterais adnatas até metade do labelo. Labelo lobado, base com duas glândulas longitudinais na direção da própria base, unguículo bifido.

COMENTÁRIO

Veyretia é um gênero Neotropical com cerca de seis espécies. Anteriormente incluídas em *Sarcoglottis*, o qual difere pelas plantas mais delicadas e esguias e flores com cunículo bifido, enquanto *Sarcoglottis* apresenta plantas mais robustas e flores com cunículo único.

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Campo de Altitude, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Tocantins)

Nordeste (Bahia, Maranhão, Sergipe)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

Possíveis ocorrências

Norte (Rondônia, Tocantins)

Nordeste (Bahia, Piauí, Sergipe)

Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul)

Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Flores com margem distal das sépalas laterais erosas a ondulados, labelo com hipoquilo obdeltóide **V. hassleri**
- 1'. Flores com margem distal das sépalas laterais inteiros, labelo com hipoquilo de outra forma 2
2. Flores com labelo com hipoquilo rombico, epiquilo transverso-oblongo **V. sagittata**
- 2'. Flores com labelo com hipoquilo obovado, epiquilo de outros formatos 3
3. Flores com labelo com epiquilo obovado a transverso-oblongo e margem crenada a ondulada, rostelo oblongo **V. aphylla**
- 3'. Flores com labelo com epiquilo ovado a elíptico e margem inteira, rostelo obdeltóide **V. simplex**

BIBLIOGRAFIA

- Hoehne, F.C. (1945) Orchidaceas. In: Hoehne, F.C. (Ed.) Flora Brasílica. Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio de São Paulo, São Paulo, 389 pp., 210 t.
- Pabst, G.F.J. & Dungs, F. (1975) Orchidaceae Brasilienses 1. Brücke-Verlag Schmersow, Hildesheim, 408 pp.

Veyretia aphylla (Ridl.) Szlach.

Tem como sinônimo

basônimo *Pelexia aphylla* Ridl.
 homotípico *Sarcoglottis aphylla* (Ridl.) Schltr.
 homotípico *Spiranthes aphylla* (Ridl.) Cogn.
 heterotípico *Sarcoglottis cogniauxiana* (Barb.Rodr. ex Cogn.) Schltr.
 heterotípico *Sarcoglottis rupestris* Barb.Rodr.
 heterotípico *Sarcoglottis rupicola* Garay
 heterotípico *Spiranthes cogniauxiana* Barb.Rodr. ex Cogn.
 heterotípico *Spiranthes rupestris* var. *parviflora* Cogn.
 heterotípico *Spiranthes rupestris* Barb.Rodr.
 heterotípico *Veyretia cogniauxiana* (Barb.Rodr. ex Cogn.) Szlach.
 heterotípico *Veyretia rupestris* Szlach.
 heterotípico *Veyretia rupicola* (Garay) F.Barros

DESCRIÇÃO

Flor: sépala(s) lateral(ais) porção distal(ais) inteira; labelo com hipochilo com forma obovado(s); epichilo com forma obovado(s) à transverso oblongo(s); margem(ns) crenada(s) à ondulada(s); rostelo com forma oblonga(s).

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Campo de Altitude, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia, Sergipe)
 Centro-Oeste (Distrito Federal, Mato Grosso)
 Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

Possíveis ocorrências

Norte (Tocantins)
 Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul)
 Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)
 Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Santos, L.A.S., 447, ASE (ASE0008581), Sergipe
 Batista, J.A.N., 321, CEN (CEN00018208), Distrito Federal
 Lindman, C.A.N., A. 2429, S (S10-18461), S (S10-18463), Mato Grosso
 Usteri, A.A., 4, K (K000879235), São Paulo
 Schwacke, C.A.W., s.n., RB, 37051,  (RB00653463), Minas Gerais

Veyretia hassleri (Cogn.) Szlach.

Tem como sinônimo

basônimo *Spiranthes hassleri* Cogn.

homotípico *Sarcoglottis hassleri* (Cogn.) Schltr.

heterotípico *Veyretia undulata* Szlach.

DESCRIÇÃO

Flor: sépala(s) lateral(ais) porção distal(ais) eroso(s) à ondulada(s); **labelo** com hipochilo com forma obdeltoide(s); **epichilo** com forma espatulado(s); **margem(ns)** inteira; **rostelo** com forma oblonga(s).

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Campo de Altitude, Campo Limpo, Restinga

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

Possíveis ocorrências

Norte (Rorônia, Tocantins)

Nordeste (Bahia)

Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 14125, HBR (HBR0040503), Santa Catarina, **Typus**

Batista, J.A.N., 216, CEN (CEN00015156), Distrito Federal

Cardoso, J.C.F., 08, HUFU,  (HUFU00030642), Minas Gerais

Dutra, J., 1079, RB, 84088,  (RB00807462), ICN, 84088,  (ICN00038980), Rio Grande do Sul

Vogel-Ely, C., CVE440, ICN, 84088,  (ICN00038981), Paraná

J.F.M. Valls, 9445, CEN (CEN00070439), Mato Grosso

B.M.T. Walter, 885, CEN (CEN00015320), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Veyretia hassleri* (Cogn.) Szlach.



Figura 2: *Veyretia hassleri* (Cogn.) Szlach.



Figura 3: *Veyretia hassleri* (Cogn.) Szlach.



Figura 4: *Veyretia hassleri* (Cogn.) Szlach.



Figura 5: *Veyretia hassleri* (Cogn.) Szlach.

Veyretia sagittata (Rchb.f. & Warm.) Szlach.

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Veyretia sagittata*, .

Tem como sinônimo

basiônimo *Spiranthes sagittata* Rchb.f. & Warm.

homotípico *Gyrostachys sagittata* (Rchb.f. & Warm.) Kuntze

homotípico *Sarcoglottis sagittata* (Rchb.f. & Warm.) Schltr.

heterotípico *Spiranthes sagittata* var. *depauperata* Cogn.

heterotípico *Veyretia sagittata* var. *depauperata* (Cogn.) Szlach.

DESCRIÇÃO

Flor: sépala(s) lateral(ais) porção distal(ais) inteira; **labelo** com hipochilo com forma rombico(s); **epichilo** com forma transverso oblongo(s); **margem(ns)** inteira; **rostelo** com forma oblonga(s).

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Cerrado

Tipos de Vegetação

Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Distrito Federal)

Sudeste (Minas Gerais)

Possíveis ocorrências

Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

Batista, J.A.N., 1651, CEN (CEN00094560), Minas Gerais

Bianchetti, L.B., 952, CEN (CEN00015197), Distrito Federal

Warming, E., s.n., P (P00362943), Minas Gerais, **Typus**

Veyretia simplex (Griseb.) Szlach.

Tem como sinônimo

basônimo *Spiranthes simplex* Griseb.
 homotípico *Gyrostachys neuroptera* (Rchb.f. & Warm.) Kuntze
 homotípico *Gyrostachys simplex* (Griseb.) Kuntze
 homotípico *Sarcoglottis simplex* (Griseb.) Schltr.
 homotípico *Veyretia sincorensis* (Schltr.) Szlach.
 heterotípico *Sarcoglottis butantanensis* (Hoehne) Hoehne & Schltr.
 heterotípico *Sarcoglottis camposnovensis* (Hoehne) Hoehne
 heterotípico *Sarcoglottis caudata* R.J.V.Alves
 heterotípico *Sarcoglottis neuroptera* var. *camposnovensis* (Hoehne) Hoehne
 heterotípico *Sarcoglottis neuroptera* (Rchb.f. & Warm.) Schltr.
 heterotípico *Sarcoglottis sincorensis* (Schltr.) Schltr.
 heterotípico *Sarcoglottis tenuis* Schltr.
 heterotípico *Spiranthes butantanensis* Hoehne
 heterotípico *Spiranthes camposnovensis* Hoehne
 heterotípico *Spiranthes cordatiloba* C.Schweinf.
 heterotípico *Spiranthes lindmaniana* Kraenzl.
 heterotípico *Spiranthes longiauriculata* C.Schweinf.
 heterotípico *Spiranthes neuroptera* Rchb.f. & Warm.
 heterotípico *Spiranthes simplex* var. *neuroptera* (Rchb.f. & Warm.) Cogn.
 heterotípico *Spiranthes sincorensis* Schltr.
 heterotípico *Veyretia caudata* (R.J.V.Alves) Mytnik
 heterotípico *Veyretia lindmaniana* (Kraenzl.) Szlach.
 heterotípico *Veyretia neuroptera* var. *camposnovensis* (Hoehne) Szlach.
 heterotípico *Veyretia neuroptera* (Rchb.f. & Warm.) Szlach.

DESCRIÇÃO

Flor: sépala(s) lateral(ais) porção distal(ais) inteira; labelo com hipochilo com forma obovado(s); epichilo com forma ovado(s) à elíptico(s); margem(ns) inteira; rostelo com forma obdeltoide(s).

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Campo de Altitude, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Tocantins)

Nordeste (Bahia, Maranhão)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

Sul (Paraná)

Possíveis ocorrências

Norte (Rondônia)
Nordeste (Piauí, Sergipe)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 6763, CEN (CEN00082744), Goiás
H.S. Irwin, 10226, UB (UB0019917), NY,  (NY00910881), Distrito Federal
R.M. Harley, 11261, K (K000878182), Mato Grosso
Pereira-Silva, G., 14891, CEN (CEN00099330), Maranhão
Mello Silva, R., 2350, RB, 396486,  (RB00257115), Tocantins
Usteri, A.A., 5, K (K000878183), São Paulo
Vieira, T.L., 127, ALCB (ALCB007673), Bahia
Batista, J.A.N., 1667, CEN (CEN00098505), Minas Gerais
G. Hatschbach, 15228, MBM (MBM001346), Paraná