

Warczewiczella Rchb.f.

Thiago Erir Cadete Meneguzzo

Jardim Botânico do Rio de Janeiro; botanica@meneguzzo.net.br

Climbiê Ferreira Hall

Museu Paraense Emílio Goeldi; climbiehall@yahoo.com.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Warczewiczella*, *Warczewiczella amazonica*, *Warczewiczella wailesiana*.

COMO CITAR

Meneguzzo, T.E.C., Hall, C.F. 2020. *Warczewiczella* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB12365>.

Tem como sinônimo

homotípico *Warszewiczella* Rchb.f.

DESCRIÇÃO

Ervas epífitas, rizoma inconspícuo. Pseudobulbo inconspícuo. Folhas conduplicadas. Flores com labelo convexo e lobos laterais reto-patentes, calo lunado.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas)

Nordeste (Bahia)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo)

Possíveis ocorrências

Norte (Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)

Centro-Oeste (Mato Grosso)

Sudeste (Rio de Janeiro)

Sul (Paraná)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Flores com sépalas e pétalas brancos; labelo ao menos 5 x 4 cm, ápice emarginado, branco com venação roxa **W.**
amazonica

1'. Flores com sépalas e pétalas cremes a verdes; labelo ca. 3 x 3 cm, ápice acuminado a arredondado, roxo sem venação **W.**
walesiana

BIBLIOGRAFIA

Meneguzzo, T.E.C. (2018) *Systematics of Zygopetalum* (Orchidaceae). PhD thesis. Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 528 pp.

Warczewiczella amazonica Rchb.f. & Warsz.

Tem como sinônimo

homotípico *Warszewiczella amazonica* Rchb.f. & Warsz.

heterotípico *Warczewiczella lindenii* (Rolfe) Garnier

heterotípico *Zygopetalum lindenii* Rolfe

É sinônimo

basiônimo *Chondrorhyncha amazonica* (Rchb.f. & Warsz.) A.D.Hawkes

basiônimo *Cochleanthes amazonica* (Rchb.f. & Warcz.) R.E.Schult. & Garay

basiônimo *Zygopetalum amazonicum* (Rchb.f. & Warsz.) Rchb.f.

DESCRIÇÃO

Flor: cor das sépala(s) e pétala(s) branca; **comprimento das sépala(s) e pétala(s)** maior(es) que 4 cm; **comprimento do labelo** maior(es) que 5 cm; **largura do labelo** maior(es) que 5 cm; **ápice(s) do labelo** emarginado(s); **cor do labelo** branco com venação roxa.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas)

Possíveis ocorrências

Norte (Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)

Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, D.S., 94, RB, 589243,  (RB00824539), Acre

Bisby, F.A., P18065, INPA, 41369,  (INPA0041369), Amazonas

Warczewiczella wailesiana (Lindl.) Rchb.f. ex É.Morren

Tem como sinônimo

basiônimo *Warrea wailesiana* Lindl.
homotípico *Chondrorhyncha wailesiana* (Lindl.) A.D.Hawkes
homotípico *Cochleanthes wailesiana* (Lindl.) R.E.Schult. & Garay
homotípico *Huntleya candida* (Lindl.) Hort.
homotípico *Huntleya wailesiae* B.S.Williams
homotípico *Warszewiczella wailesiana* (Lindl.) É.Morren
homotípico *Zygopetalum wailesianum* (Lindl.) Rchb.f.
heterotípico *Cochleanthes candida* (Lindl.) R.E.Schult. & Garay
heterotípico *Cochleanthes digitata* (Lem.) R.E.Schult. & Garay
heterotípico *Huntleya imbricata* Pinel
heterotípico *Huntleya radicans* Linden
heterotípico *Warczewiczella candida* (Lindl.) Rchb.f.
heterotípico *Warczewiczella digitata* (Lem.) Barb.Rodr.
heterotípico *Warrea candida* Lindl.
heterotípico *Warrea digitata* Lem.
heterotípico *Zygopetalum candidum* (Lindl.) Rchb.f.

DESCRIÇÃO

Flor: cor das sépala(s) e pétala(s) creme a(s) verde; **comprimento das sépala(s) e pétala(s)** cerca de 2.5 cm; **comprimento do labelo** cerca 3 cm; **largura do labelo** cerca 3 cm; **ápice(s) do labelo** acuminado(s) a(s) arredondado(s); **cor do labelo** roxo sem venação.

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo)

Possíveis ocorrências

Sudeste (Rio de Janeiro)

Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.A. Folli, 2316, RB, 374243,  (RB00604298), Espírito Santo
G. Gardner sub. G. Wailes, s.n., K,  (K000857160), **Typus**

Gardner, G., s.n., K,  (K000857168), **Typus**
Silva, E.F., s.n., SP, 247597,  (SP033154), Bahia
Heringer, E.P., 489, SP, 45304,  (SP033166), Minas Gerais
Mazzini, E., 5, SP, 35808,  (SP033155), Espírito Santo
Loefgren, A., CGG3260, SP, 29547,  (SP009499), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Warczewiczella wailesiana* (Lindl.) Rchb.f. ex É.Morren



Figura 2: *Warczewiczella wailesiana* (Lindl.) Rchb.f. ex É.Morren



Figura 3: *Warczewiczella wailesiana* (Lindl.) Rchb.f. ex É.Morren

BIBLIOGRAFIA

Meneguzzo, T.E.C. (2018) *Systematics of Zygotepalum* (Orchidaceae). Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 528 pp.