

# Worsleya Traub

Julie Henriette Antoinette Dutilh

Universidade Estadual de Campinas; judutilh@yahoo.com

Antonio Campos Rocha

Universidade Estadual de Campinas; camposrocha@hotmail.com

Agostina Belén Sassone

Instituto Darwinion; asassone@darwin.edu.ar

Renata Souza de Oliveira

Universidade de São Paulo; rsolive1@gmail.com

Liliana Mónica Giussani

Instituto Darwinion; liligiussani@yahoo.com.ar

Alan W. Meerow

United States Department of Agriculture; griffinia@gmail.com

João Semir

Universidade Estadual de Campinas; semir@unicamp.br

Nathália Susin Streher

Universidade Estadual de Campinas; nathistreher@yahoo.com.br

Nicolás Garcia

University of Florida; nicogarciab@gmail.com

---

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Worsleya*, *Worsleya procera*.

## COMO CITAR

Dutilh, J.H.A., Campos-Rocha, A., Sassone, A.B., Oliveira, R.S., Giussani, L.M., Meerow, A.W., Semir, J. (in memoriam), Streher, N.S., Garcia, N. 2020. *Worsleya* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4370>.

## DESCRIÇÃO

Erva bulbosa saxícola com bulbo mais largo na base afilando-se gradualmente por até ca. 1,5m. Folhas 10-18, com até ca. 1m de comprimento, loradas, bastante falcadas, estriadas, margem cartilaginosa, ápice arredondado, todas pendentes para o mesmo lado acompanhando a inclinação da rocha. Escapo cheio e achatado com ca. de 50cm de comprimento, espata com 4 brácteas imbricadas, inflorescência com 4 a 14 flores de 10-17cm comp., infundibuliformes, cor lilás. Cápsula trilocular, sementes numerosas, negras, planas, espessas.

## Forma de Vida

Erva

**Substrato**

Rupícola

**DISTRIBUIÇÃO**

Nativa, é endêmica do Brasil

**Domínios Fitogeográficos**

Mata Atlântica

**Tipos de Vegetação**

Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

**Distribuição Geográfica**

Ocorrências confirmadas

Sudeste (Rio de Janeiro)

# *Worsleya procera* (Lem.) Traub

## Tem como sinônimo

basônimo *Hippeastrum procerum* Lem.

heterotípico *Amaryllis rayneri* Hook.f.

heterotípico *Worsleya raineri* (Hook.) Traub & Moldenke

heterotípico *Worsleya rayneri* (Hook.f.) Traub & Moldenke

## DESCRIÇÃO

Bulbo com até 15 cm de altura, colo com mais de 50 cm de comprimento, folhas falcadas, paralelinerves, escapo com 4 bracteias espatais, inflorescência com 3 a 10 flores, de ca. de 12 cm de comp., declinadas, cor lilás claro a azulado, com pequenas pintas arroxeadas ou avermelhadas, base das tépalas esbranquiçadas, estames ca. de 3/4 do comp. do perigônio, estilete mais longo que estames, estigma capitado, sementes negras, arredondadas.

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Rupícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

## Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sudeste (Rio de Janeiro)

## MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 6748, RB, 199213 (RB00469694), Rio de Janeiro